

簡介

- 眼底螢光血管造影術是一個簡單、安全、有效的檢查視網膜(眼底)方法。
- 從觀察和拍攝眼底血液循環的過程中，醫生能夠更準確地診斷病情及計劃合適的治療方案。此方法可適用於檢查不同的視網膜病變，包括有炎症、水腫、血管異常、瘤腫或一些系統性疾病如糖尿及血壓高等。

檢查過程

1. 首先滴擴瞳眼藥水把瞳孔放大。
2. 將螢光劑注射入手臂的血管。
3. 注射螢光劑時可能引致短暫作悶作嘔情況，但無大礙。用特別的照相機拍攝眼底照片。
4. 整個過程需時約三十至四十分鐘，閃光燈的強光會使眼睛感到短暫不適。

檢查前準備

1. 螢光劑可能影響胎兒，因此孕婦應避免接受此檢驗。
2. 約萬分之一的病人對螢光劑有嚴重過敏反應，導致呼吸困難、休克、甚至有生命危險。凡對藥物或食物有過敏或心臟病患者，檢查前應先通知醫護人員。
3. 醫生會向病者解釋檢查過程及可能發生的併發症及簽檢查同意書。

檢查後要注意事項

1. 因放大瞳孔的關係，當日的視力會模糊，特別是看近的事物。因此檢查當日不宜駕駛。
2. 配戴太陽眼鏡可以減低擴瞳後的畏光現象。
3. 螢光劑會導致當日的小便、皮膚、眼白呈現黃色。請多喝開水，使螢光劑經由小便排出體外。

備註 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name: _____

Pt No.: _____ Case No.: _____

Sex/Age: _____ Unit Bed No: _____

Case Reg Date & Time: _____

Attn Dr: _____

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____