

### 簡介

將二氧化碳注入腹腔，經腹壁上一小切口插入腹腔鏡，通過它進行腹腔內的手術。

### 適應症

盤腔腫瘤、經期量多、子宮肌瘤。

### 手術過程

1. 全身麻醉。
2. 插入導尿管。
3. 以二氧化碳注入腹腔來形成氣腹。
4. 製造切口。
5. 將腹腔鏡及其它儀器插入腹腔。
6. 先將子宮上部游離。
7. 從陰道沿子宮頸製造切口。
8. 同時將子宮下部游離。
9. 子宮由陰道取出。
10. 縫合陰道及腹部傷口。
11. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理。
12. 手術期間可能要採用的其他相關步驟如：輸卵管及卵巢切除術（預防性或有病變時）。

### 手術前準備

1. 主診醫生會與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書。
2. 手術前 6-8 小時開始禁食。
3. 抽血作檢驗。
4. 遵照醫生指示，如有需要會進行迅速灌腸，清除糞便。
5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除。

### 可能出現風險及併發症

- 麻醉併發症。
- 過量出血，可能需要輸血。
- 損傷附近器官特別是膀胱，尿道、腸道和血管，以致需要修補。
- 盤腔感染。

醫療程序須知 -  
腹腔鏡輔助經陰道子宮或加雙側輸卵管及卵巢切除術

- 傷口併發症如感染、小腸氣(機會較低)。
- 如有需要改回剖腹術。
- 深層靜脈栓塞。

手術後要注意事項

1. 請根據醫囑服用醫生處方的止痛藥。
2. 術後 2 個月內避免性行為。而個人衛生方面，可花洒淋浴。
3. 術後 2 個月內避免提起過重的物件。
4. 如嚴重腹痛、滲膿、陰道大量出血、發熱(體溫 38°C 或 100°F 以上)，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 有機會提早 2-4 年進入更年期。
6. 停經前婦女接受卵巢切除後會出現更年期綜合症，與醫生商討後如有需要，可服用補充荷爾蒙的藥物。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料 : [http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests\\_procedures.html](http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

.....

\_\_\_\_\_ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

**Name:**

Pt No.:            Case No.:

Sex/Age:            Unit Bed No.:

Case Reg Date & Time:

Attn Dr:

病人 / 病人家屬簽署: \_\_\_\_\_

病人 / 病人家屬姓名: \_\_\_\_\_

家屬關係 (如適用): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_