

簡介

將二氧化碳注入腹腔，經腹壁上小切口插入腹腔鏡及其他儀器，通過它進行腹腔內的手術。

適應症

卵巢囊腫或卵巢腫瘤。

手術過程

1. 全身麻醉。
2. 製造切口。
3. 以二氧化碳注入腹腔來形成氣腹。
4. 將窺鏡及其它儀器插入腹腔。
5. 將切除組織放入樣本袋內。
6. 樣本亦可經由陰道取出。
7. 腹部 (及陰道) 傷口縫合。
8. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理。

手術前準備

1. 主診醫生會與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書。
2. 手術前 6-8 小時開始禁食。
3. 抽血作檢驗。
4. 遵照醫生指示，如有需要會進行迅速灌腸，清除糞便。
5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除。

可能出現的風險及併發症

- 麻醉的併發症。
- 過量出血，可能需要輸血。
- 可能損傷附近器官如膀胱、輸尿管、腸道或血管；以致需要修補。
- 盤腔感染。
- 傷口併發症如感染、小腸氣。
- 囊腫破裂機會較大；而受到囊腫破裂後的内容物所影響。
- 需要轉為剖腹術。
- 若是惡性，便需要進行剖腹術。
- 可能性交有困難如陰道曾進行過縫合術。

醫療程序須知 -
腹腔鏡卵巢囊腫切除/腹腔鏡輸卵管卵巢切除

- 可能影響未來生殖能力。

手術後要注意事項

1. 請根據醫囑服用醫生處方之止痛藥。
2. 如嚴重腹痛、傷口滲膿、陰道大量出血或發熱(體溫 38°C 或 100°F 以上)等, 請即聯絡主診醫生或回院診治。
3. 荷爾蒙分泌有機會受影響, 視乎有多少卵巢組織被破壞。
4. 卵巢囊腫有機會復發, 特別是子宮內膜異位。請遵照醫生的指示, 按時覆診。

不接受手術的風險

- 卵巢囊腫可能產生併發症, 如扭轉、出血、破裂及囊腫內出血。
- 未能及早作出診斷, 卵巢囊腫是否惡性須在切除後化驗才可確定。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考, 而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢, 請與你的醫生聯絡。

參考資料: http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序, 本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問, 並獲得充份解答。

Name: _____

Pt No.: _____ Case No.: _____

Sex/Age: _____ Unit Bed No: _____

Case Reg Date & Time: _____

Attn Dr: _____

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____