

簡介

切除中耳及乳突氣房病灶

適用情況

1. 膽脂瘤
2. 急性乳突炎
3. 慢性化膿性中耳炎和乳突炎
4. 腫瘤

預期結果

1. 清除膽脂瘤
2. 處理中耳和乳突感染
3. 有機會不能完全減輕症狀和有可能復發
4. 清除腫瘤

手術不能解決的問題

1. 耳鳴
2. 暈眩
3. 弱聽

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行
2. 皮膚切口會在耳前或耳後
3. 乳突內的病灶會在顯微鏡下切除
4. 在大多情況下，手術後傷口需加壓包紮
5. 如有需要會用面神經顯示監察

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

常見副作用和併發症(≥1%風險)

1. 復發或殘留
2. 感染
3. 出血
4. 傳導性弱聽加重
5. 失去味覺或味覺紊亂
6. 對耳道填塞物過敏
7. 暈眩

不常見的嚴重風險或併發症(<1%風險)

1. 面癱
2. 失去部份或全部聽力
3. 耳道狹窄
4. 耳廓變形
5. 顱內損傷，導致腦脊液漏，感染和出血
6. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

手術前準備

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
2. 手術前可能需要剃除耳朵旁邊毛髮。

手術後須知

1. 耳朵可能會出現痛楚或阻塞的感覺。
2. 壓力敷料通常會在一日後拆除，請切勿自行拆除耳內敷料。醫生在覆診時，會替你更換或拆除敷料。
3. 耳朵排出一些分泌物乃屬正常。請切勿讓水流入耳內。

其它治療方法

1. 定期耳道清潔和藥物治療
2. 抗菌素滴耳

不治療的後果

疾病惡化和出現併發症

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序, 本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問, 並獲得充份解答。

Name: _____

Pt No.: _____ Case No.: _____

Sex/Age: _____ Unit Bed No: _____

Case Reg Date & Time: _____

Attn Dr: _____

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____