

簡介

是用一柄能發熱的電圈型手術刀去除子宮頸上異變的組織。

適應症

1. 子宮頸高度鱗狀表皮病變。
2. 持續低度鱗狀表皮病變。

手術過程

1. 局部或全身麻醉。
2. 先用陰道鏡檢查子宮頸及確定病變的位置。
3. 以一柄通電的電圈手術刀切除子宮頸病變區域。
4. 用球狀電燒器或用止血藥水止血。
5. 被切除的組織會送到化驗所化驗。

手術前準備

1. 主診醫生會與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書。
2. 手術前病者需要除掉身上所有金屬物件，例如手錶、耳環等。
3. 抽血作檢驗。
4. 如全身麻醉，手術前 **6-8** 小時開始禁食。
5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除。

可能出現的風險及併發症

- 麻醉併發症。
- 電燒灼傷附近器官，如膀胱、陰道和直腸。
- 出血。
- 繼發性出血。
- 感染。
- 復發。

手術後要注意事項

1. 手術後 7-10 天可能會有陰道出血。術後約 2-3 週內或有輕微腹痛現象。
2. 傷口需時癒合，避免手術後進行性行為、游泳及使用內用衛生棉條，請諮詢你的醫生同意後，才可恢復。
3. 請根據醫囑服用醫生處方之止痛藥及抗生素。
4. 如嚴重腹痛、陰道大量出血或發熱(體溫 38°C 或 100°F 以上)等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 需要定期做子宮頸細胞檢查。
6. 沒有證據顯示一次的治療會對將來成孕有負面影響。

不接受手術的風險

- 病變持續。
- 甚至進展為子宮頸癌。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料： http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name: _____

Pt No.: _____ Case No.: _____

Sex/Age: _____ Unit Bed No: _____

Case Reg Date & Time: _____

Attn Dr: _____

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____