

簡介

切除扁桃體。

適應症

1. 復發性或慢性扁桃體炎。
2. 扁桃體周圍膿腫。
3. 阻塞性睡眠窒息綜合症或鼻鼾症。
4. 活組織檢查。
5. 扁桃體惡性腫瘤。
6. 手術進路。

預期結果

1. 減少咽喉感染。
2. 減輕睡眠窒息或打鼻鼾。
3. 病理診斷。
4. 有機會不能全部清除病灶和有可能復發。

※手術不能解決的問題 非桃體引致的咽喉問題。

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行。
2. 醫生會經口腔切除扁桃體。

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
3. 手術前 6-8 小時開始禁食。
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等。

可能出現風險及併發症

- 常見副作用和併發症 ($\geq 1\%$): 出血、疼痛、感染、口腔局部損傷。
- 不常見的嚴重風險或併發症 ($<1\%$):
 1. 牙齒損傷。
 2. 下頷損傷。
 3. 聲音改變。
 4. 上氣道阻塞。
 5. 術後肺水腫。
 6. 頸椎損傷。

7. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡。

手術後要注意事項

1. 手術後會出現喉痛及少許吞嚥困難，情況會持續數日。
2. 唾液帶小量的血乃屬正常。不過，假如出現持續口腔出血，請立即前往就近急症室求診。
3. 遵照醫生指示，按時覆診。

其它治療方法

1. 抗生素治療感染。
2. 持續正壓呼吸機治療阻塞性睡眠窒息綜合症。
3. 放射治療或化療治療惡性腫瘤。

不接受治療的後果

1. 扁桃體炎或扁桃體周圍膿腫復發和出現併發症。
2. 阻塞性睡眠窒息綜合症的併發症。
3. 不能準確診斷腫瘤。

備註 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name:

Pt No.:

Case No.:

Sex/Age:

Unit Bed No:

Case Reg Date & Time:

Attn Dr:

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____