

簡介

- 巴托林腺是位於陰道和外生殖器(外陰)接合處的一對腺體。其分泌物潤滑外陰是可幫助性交時陰莖的插入。而位於陰道口周圍的前庭小腺功能與此相同。
- 放膿造袋術是把位於女性外生殖器官上生長一種良性的腫瘤，將此囊腫切開，清除內容物，然後把囊腫的邊緣與皮膚切口縫合，在肉芽組織生長之前，傷口保持開放。

適應症

1. 外陰部位會出現紅腫及疼痛。
2. 當行走，坐着或性交時會感到不適。
3. 未能確診病情及囊腫的性質。

手術過程

1. 全身麻醉。
2. 然後將囊腫切開，清除內容物。
3. 除非特別聲明，囊腫的內容物會送交微生物部門，作細菌培植及藥物敏感測試。
4. 用可自行吸收的縫線把囊腫邊緣與皮膚切口縫合。

手術前準備

1. 主診醫生會與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書。
2. 如要全身麻醉，於手術前 6-8 小時開始禁食。
3. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除。

可能出現的風險及併發症

1. 麻醉併發症。
2. 傷口感染。
3. 傷口出血。
4. 囊腫可能再復發。

手術後要注意事項

1. 傷口會有少量出血或滲出分泌物的情況，可能持續約一星期。
2. 如出現大量出血、滲膿、惡臭等，請即與你的醫生聯絡。
3. 請根據醫囑服用醫生處方之止痛藥和抗生素。
4. 在恢復性行為之前，請先諮詢你的醫生。

備註 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：

Folashade Omole, M.D., Barbara J. Simmons, M.D., and Yolanda Hacker, M.D. *Am Fam Physician*. 2003 Jul 1; 68(1):135-140.

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name:

Pt No.:

Case No.:

Sex/Age:

Unit Bed No:

Case Reg Date & Time:

Attn Dr:

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____