

簡介

矯正偏曲的鼻骨。

適應症

1. 鼻骨偏曲引起的鼻塞。
2. 改善歪鼻骨。

預期結果

1. 減輕鼻塞。
2. 改善歪鼻骨。

※ 手術不能解決的問題
非鼻骨偏曲導致的鼻塞。

手術過程

1. 鼻骨復位。
2. 通常會使用鼻外夾板固定位置。

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 告知醫生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓及定時服用的藥物，包括中藥及保健食品。
3. 手術前 6-8 小時開始禁食。
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等。

可能出現風險及併發症

- 常見副作用和併發症：出血、持續鼻塞、感染、鼻腔黏連、鼻中隔血腫、持續鼻畸形。
- 不常見的嚴重併發症(<1%)：
 1. 使用鼻敷料或導致中毒性休克。
 2. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡。

手術後要注意事項

1. 手術後可能要服用止痛藥。
2. 可能會有輕微鼻出血，但假如情況持續應前往就近急症室求診。
3. 睡覺時頭部略為墊高，有助減少手術後出現水腫情況。
4. 不應擤鼻。
5. 在手術後數星期應避免進行劇烈運動或接觸球類體育運動。
6. 遵照醫生指示，按時覆診。

其他治療方法

觀察病情進展，再作打算。

不接受治療的後果

1. 持續鼻塞。
2. 持續鼻變形。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name: _____

Pt No.: _____ Case No.: _____

Sex/Age: _____ Unit Bed No: _____

Case Reg Date & Time: _____

Attn Dr: _____

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____