

簡介

帶有一條光源的管形器械，令宫腔膨脹後，觀察子宮內部及可進行切除肌瘤或息肉手術。

適應症

- 不正常子宮出血。
- 肌瘤或子宮內膜息肉。
- 取出殘留子宮環。
- 子宮內膜增厚或懷疑子宮內膜病變。
- 切除子宮內膜黏連。

手術過程

1. 全身麻醉 / 區域性麻醉。
2. 擴張子宮頸。
3. 插入切除鏡。
4. 注入甘氨酸 / 生理鹽水以膨脹宮腔。
5. 宫腔鏡直接監察下進行切除肌瘤 / 息肉。
6. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理。

手術前準備

1. 進行此手術，最理想的時候是月經剛剛結束後。
2. 主診醫生會與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書。
3. 抽血作檢驗。
4. 如全身麻醉，手術前 6-8 小時前開始禁食。
5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除。

可能出現風險及併發症

- 麻醉併發症。
- 過量出血，可能需要輸血。
- 盆腔感染。
- 子宮頸撕裂。
- 子宮穿孔及有機會損傷附近器官，可能需要剖腹探查或修補。
- 甘氨酸攝入過多。
- 未能完成切除而需要再進行手術。
- 復發。

手術後要注意事項

1. 手術後 2 週內或有陰道出血現象。
2. 月經會回復過往的模式。
3. 如腹部劇痛、流膿、陰道大量出血、發熱 (體溫 38°C 或 100°F 以上)等, 請即聯絡主診醫生或回院診治。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考, 而對於某類病人或個別人士可能發生的 風險或併發症未能盡錄。如有查詢, 請與你的醫生聯絡。

參考資料 : http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序, 本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問, 並獲得充份解答。

Name:

Pt No.:

Case No.:

Sex/Age:

Unit Bed No:

Case Reg Date & Time:

Attn Dr:

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____