

簡介

長期及暫時性血液透析治療的腎病患者，需要接受靜脈留置透析管置入手術，以便日後作長期或暫時性血液透析或血液透析濾過交換治療之用。

手術過程

1. 進行此手術須局部或全身麻醉。
2. 雙腔導管置入手術是一種小型手術。
3. 醫生會選擇置入終頸內靜脈、鎖骨下靜脈或股靜脈位置。

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 腎科專科醫生會評估病人，以決定靜脈留置透析管置入部位。
3. 病人應保持置入部位皮膚完整，以免感染。如置入位置於股靜脈，手術前先進行毛髮刮屑。

可能出現風險及併發症

- 氣胸
- 血胸
- 動脈穿刺
- 心律不齊
- 導管感染或導管周圍皮膚感染
- 導管栓塞
- 導管異位
- 置入血管狹窄

手術後要注意事項

甲. 住院護理

1. 置入手術成功後，靜脈留置透析管會用防水敷料固定於頸側，胸腔上或股靜脈位置，X光檢查以確定位置。
2. 病人如感到手術部位有痛楚，可向醫護人員索取止痛藥，如無大礙，手術當天便可出院。

乙. 出院後家居護理

1. 病人應該珍惜其靜脈留置透析管，視之為「生命線」，應時常保持導管敷料完整及乾爽。
2. 保持導管敷料完整及乾爽，如有鬆散或沾濕，應立刻通知腎科醫護人員



醫療程序須知 - 接受靜脈留置透析導管置入手術

以作更換及觀察有否感染。

3. 應避免穿著“過頭笠”式衣服，可穿著“開胸”式衣服，如襯衣或恤衫，以避免牽拉導管。
4. 應保持個人衛生，不可浸浴，每天可用保鮮紙及毛巾覆蓋導管作淋浴。
5. 每日應觀察導管敷料，有否滲血，滲液或異味，如有異常應立刻通知腎科醫護人員。
6. 如有任何小手術的安排，例如脫牙，應在事前通知醫護人員，因可能要於事前服食抗生素以防感染。

備註

- 靜脈留置透析管的好與壞，直接影響血液透析的效果。因此，每位血液透析的病人都必須好好照顧自己的導管，以策安全。
- 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name:

Pt No.: Case No.:

Sex/Age: Unit Bed No.:

Case Reg Date & Time:

Attn Dr:

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____