



簡介

當你被懷疑有機會患上前列腺癌，醫生便可能建議你進行經直腸前列腺穿刺活組織檢查。經直腸前列腺針抽取活組織檢查是唯一能診斷前列腺癌之檢查。這是一個侵入性檢查，及帶有一定風險。但陰性結果卻不能完全排除癌症發生的可能性。

適應症

1. 臨床診斷懷疑患上前列腺癌。
2. 肛門指診有前列腺結節。
3. 前列腺特異抗原血液測試水平上升。
4. 為前列腺癌重新分期。

手術過程

1. 前列腺穿刺活檢大概需時 10-15 分鐘。
2. 透過將超聲波探頭放入直腸，醫生會利用探針對你的前列腺進行多個活組織穿刺。
3. 將多個活組織送往化驗。

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 若你服用影響凝血功能的藥物，例如亞士匹寧或薄血丸，請於進行檢查前告訴醫生，這些藥物在術前應停止服用。
3. 檢查前如果有尿感染的症狀，例如發燒或小便赤痛，亦宜將有關病徵向醫生報告。
4. 無須禁食。



可能出現風險及併發症

- 敗血症引致生命危險 (<1%)。
- 尿路感染 (1-5%)。
- 肛門出血。
- 小便帶血 (可持續 1 至 2 星期)。
- 精液帶血 (可持續 6 星期)。
- 小便困難 / 尿瀰留。

手術後要注意事項

1. 檢查後的小便、大便或精液帶血是偶有發生的。
2. 進行檢查後的數天適宜多喝開水。
3. 如大量出血、劇烈痛楚、發熱(如體溫 38°C 或 100°F 以上), 請即與你的醫生聯絡。
4. 請遵照醫生的指示, 按時覆診。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考, 而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢, 請與你的醫生聯絡。

參考資料 : http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序, 本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問, 並獲得充份解答。

Name: _____

Pt No.: _____ Case No.: _____

Sex/Age: _____ Unit Bed No: _____

Case Reg Date & Time: _____

Attn Dr: _____

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____