

簡介

經陰道切除子宮及修補骨盆底的肌肉，提供承托的能力。

適應症

- 子宮下垂。
- 因器官下墜引致不適而影響日常生活。
- 影響排尿功能。
- 治療骨盆底的訓練失敗。

手術過程

1. 全身麻醉。
2. 於陰道壁造切口。
3. 切除子宮及經陰道取出。
4. 修剪多餘陰道組織。
5. 進行骨盆底修補。
6. 手術後，可能需要導尿管及傷口引流管。
7. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理。

手術前準備

1. 主診醫生會與病者解釋做手術的原因、過程和可能出現的併發症，而病者需簽署手術同意書。
2. 手術前 6-8 小時開始禁食。
3. 抽血作檢驗。
4. 遵照醫生指示，如有需要會進行迅速灌腸，清除糞便。
5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除。

醫療程序須知 -
經陰道子宮切除及骨盆底修補術

可能出現的風險及併發症

- 麻醉的併發症。
- 過量出血，可能需要輸血。
- 損傷附近器官例如膀胱、輸尿管及腸道，以致需要修補。
- 盤腔感染。
- 手術後排尿可能有困難。
- 可能需要進行剖腹手術。
- 可能出現壓力性尿失禁。
- 有機會出現陰道頂端脫垂。

手術後要注意事項

1. 請根據醫囑服用醫生處方之止痛藥。
2. 如嚴重腹痛、傷口滲膿、陰道大量出血或發熱(如體溫 38°C or 100°F 或以上)等，或當排尿時有灼熱感，請盡快與你的醫生聯絡。
3. 術後避免提起過重的物件。
4. 切勿在術後 6 星期內進行性行為，直至經醫生檢查後才可恢復。

不接受手術的風險

病徵持續或惡化，影響生活質素。

備註 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料： http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name: _____

Pt No.: _____

Case No.: _____

Sex/Age: _____

Unit Bed No: _____

Case Reg Date & Time: _____

Attn Dr: _____

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____