

簡介

矯正彎曲的鼻中隔。

適應症

1. 鼻中隔彎曲引起的鼻塞。
2. 鼻竇竇口引流阻塞導致的鼻竇炎。
3. 鼻出血。
4. 鼻中隔引致的頭痛。
5. 其它鼻手術進路。
6. 鼻中隔彎曲，引致的歪鼻畸形。

預期結果

1. 減輕鼻塞。
2. 減輕竇口阻塞。
3. 減少鼻出血。
4. 緩解鼻中隔刺導致的頭痛。
5. 改善歪鼻畸形。
6. 有機會不能全部清除病灶和有可能復發。

※ 手術不能解決的問題

1. 非鼻中隔彎曲導致的鼻塞。
2. 過敏性鼻炎導致的症狀如鼻癢、噴嚏、後鼻漏。

手術過程

醫生透過鼻內的切口，以撼動、重新定位及切除等方式糾正彎曲的鼻中隔。

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。

可能出現風險及併發症

- 常見副作用和併發症 ($\geq 1\%$): 出血、鼻塞、感染、鼻腔黏連、鼻中隔血腫、鼻中隔穿孔。
- 不常見的嚴重風險或併發症 ($<1\%$):
 1. 鼻樑塌陷。
 2. 失去嗅覺。
 3. 腦髓液鼻漏。
 4. 中毒性休克。
 5. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡。

手術後要注意事項

1. 手術後醫生會於手術的一邊或兩邊置入鼻敷料，你可能需要用口呼吸。鼻內敷料會於一兩日後取走。
2. 取走敷料後可能會有輕微出血，但不久便會自動止血。
3. 取走敷料後你可以離院返家。鼻水帶小量的血乃屬正常，同時也會出現鼻塞的情況。假如出現持續出血，請立即前往就近的急症室求診。
4. 遵照醫生指示，按時覆診。

其它治療方法

藥物治療。

不接受治療的後果

1. 持續鼻塞。
2. 鼻竇炎及併發症。
3. 復發性鼻出血。
4. 持續頭痛及鼻畸形。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name:

Pt No.:

Case No.:

Sex/Age:

Unit Bed No:

Case Reg Date & Time:

Attn Dr:

病人 / 病人家屬簽署: _____

病人 / 病人家屬姓名: _____

家屬關係 (如適用): _____

日期: _____