

### 簡介

切除下鼻甲。

### 適應症

下鼻甲肥大引致的鼻塞。

### 預期結果

1. 緩解鼻塞。
2. 有機會不能完全改善鼻塞和有可能復發。

※ 手術不能解決的問題 非  
下鼻甲肥厚引致的鼻塞。

手術過程 醫生會以手術儀器經鼻孔切除鼻腔內肥大的下鼻甲，然後進行止血。

### 手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
3. 手術前 6-8 小時開始禁食。
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等。

### 可能出現風險及併發症

- 常見副作用和併發症 ( $\geq 1\%$ ): 出血、持續鼻塞、感染、鼻腔粘連、暫時痂皮。
- 不常見的嚴重風險或併發症 ( $<1\%$ ):
  1. 萎縮性鼻炎。
  2. 咽鼓管損傷。
  3. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡。

### 手術後要注意事項

1. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料，所以你可能要用口呼吸，敷料會於一至兩天後取走。
2. 取走敷料後可能有輕微出血，但通常都會自行止血。

- 敷料取走後，你可以出院回家。鼻水帶有小量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續不止，請前往就近的急症室求診。
- 遵照醫生指示，按時覆診。

其它治療方法

藥物治療。

不接受治療的後果

持續鼻塞。

備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料： [http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests\\_procedures.html](http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

\_\_\_\_\_ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name: \_\_\_\_\_

Pt No.: \_\_\_\_\_

Case No.: \_\_\_\_\_

Sex/Age: \_\_\_\_\_

Unit Bed No: \_\_\_\_\_

Case Reg Date & Time: \_\_\_\_\_

Attn Dr: \_\_\_\_\_

病人 / 病人家屬簽署: \_\_\_\_\_

病人 / 病人家屬姓名: \_\_\_\_\_

家屬關係 (如適用): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_