

## 簡介

通過內窺鏡，去除鼻及鼻竇疾病，建立鼻竇引流。

## 適應症

1. 鼻竇炎。
2. 鼻息肉。
3. 鼻或鼻竇腫瘤。

## 預期結果

1. 改善鼻塞、後鼻漏、面部疼痛、頭痛等問題。
2. 預防鼻竇炎併發症。
3. 摘除腫瘤。
4. 或有機會不能完全減輕症狀和有可能復發。

※ 手術不能解決的問題 其它過敏症狀  
：噴嚏、鼻癢、流鼻水。

## 手術過程

1. 手術會在內窺鏡控制和監察下進行。
2. 疾病組織會被切除，正常結構則予保留。

## 手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
3. 手術前 6-8 小時開始禁食。
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等。

## 可能出現風險及併發症

- 常見副作用和併發症 ( $\geq 1\%$ ): 鼻膜出血、感染、鼻腔粘連、復發。
- 不常見的嚴重風險或併發症 ( $<1\%$ ):
  1. 損傷頸內動脈、篩前後動脈和蝶腭動脈，引致大出血。
  2. 眼損傷，包括眼眶周圍有淤血、眼球血腫或膿腫、重影、失明。
  3. 淚管損傷，引致流淚。
  4. 腦損傷，包括腦髓液鼻漏、腦膜炎、腦膿腫、腦氣腫。
  5. 粘液囊腫。

6. 聲音改變。
7. 暫時或永久失去嗅覺。
8. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡。

#### 手術後要注意事項

1. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料，所以你可能要用口呼吸，敷料會於一至兩天後取走。
2. 取走敷料後可能有輕微出血，但通常都會自行止血。
3. 敷料取去後，你可以出院回家。鼻水帶有小量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續不止，請前往最近的急症室求診。
4. 遵照醫生指示，按時覆診。

#### 其它治療方法

激素或抗生素治療感染。

#### 不接受治療的後果

1. 症狀持續或加重。
2. 鼻竇炎併發症。

備註 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

參考資料：[http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests\\_procedures.html](http://www21.ha.org.hk/smartpatient/tc/operationstests_procedures.html)

\_\_\_\_\_ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

Name: \_\_\_\_\_

Pt No.: \_\_\_\_\_ Case No.: \_\_\_\_\_

Sex/Age: \_\_\_\_\_ Unit Bed No: \_\_\_\_\_

Case Reg Date & Time: \_\_\_\_\_

Attn Dr: \_\_\_\_\_

病人 / 病人家屬簽署: \_\_\_\_\_

病人 / 病人家屬姓名: \_\_\_\_\_

家屬關係 (如適用): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_