



醫療程序須知 -
子宮卵管造影

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

介紹

1. 這項程序主要用以透視女性的生育系統，包括子宮及輸卵管。通常用作檢查婦女不育之原因。
2. 這項程序由放射科醫生在 X 光透視監察下進行。

不適合人士

1. 懷疑有孕或有盤腔炎、盤腔感染的婦女不應進行此項程序。

過程中

1. 醫生會將子宮鏡伸入陰道，將導管導入子宮頸，並注入造影劑。
2. 然後進行連串 X 光拍攝，以記錄造影劑流入子宮及輸卵管的情況。
3. 整個程序約需 20-30 分鐘。
4. 在注入造影劑時，如病人有輸卵管痙攣/閉塞，或者造影劑出現腹膜溢出情況，病人或會感到下腹疼痛。



風險和併發症

1. 病人或會有短暫噁心、嘔吐、頭痛、子宮及子宮頸創傷引致出血等情況。
2. 罕見的併發症包括盤腔炎、造影劑內滲、及對造影劑出現過敏反應。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. ACR Manual on Contrast Media (2023)

本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問, 並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期