



**醫療程序須知**  
**接受動脈或靜脈注射造影劑**

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

*Please fill in /  
affix patient's label*

Page No:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  |
| +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 |

你獲安排接受一項 X 光檢查，而檢查前你需接受動脈或靜脈注射造影劑。一般來說，造影劑是一種安全藥物，但有時亦可能會引起副作用。各類可能會產生的副作用如下：

**輕微副作用**

例如痕癢、蕁麻疹、作嘔、嘔吐、熱暖感覺、臂痛、打噴嚏、咳嗽等。

**較嚴重的副作用**

例如氣喘、心律不調、胸口痛、抽搐、腎衰竭、低血壓、昏迷等；這些副作用通常都需要醫生診治而機會率約為一萬分之四。

**死亡**

這種情況很罕有，機會率約為百萬分之二點一。

**延遲性的副作用**

很少病人會出現延遲性的副作用，症狀包括臂痛、痕癢、皮疹、唾液腺疼痛 或腫脹等。

**造影劑外滲**

注射造影劑時有可能意外地由針口滲漏到手臂的軟組織，會引致局部腫痛；一般腫痛數日內會消失。嚴重的外滲情況有可能導致皮膚組織壞死。

假如糖尿病人正在接受 **甲福明 (Metformin)** 治療及其腎功能下降，接受注射造影劑會增加乳酸中毒的機會。

**備註**

如病人對本檢查有任何疑問或有不清楚之處，請向本部門職員查詢。

**參考資料**

1. 智友站 (網址: [www.21.ha.org.hk](http://www.21.ha.org.hk))
2. ACR Manual on Contrast Media (Version 10.3, 2018)
3. Local Radiation Protection Rules of Radiology Department, St. Paul's Hospital (Version 5.0, 2019)

本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問, 並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期