聖保祿醫院
St. Paul's Hospital

ZDIX_PIS02_P	(V3) Jul 2025

醫療程序須知
接受動脈或靜脈注射造影劑

Visit No.:	Dept.:
Name:	Sex/Age:
Doc. No.:	Adm. Date:
Attn. Dr.:	
Patient No.: PN	Please fill in / affix patient's label

接受造影劑 X 光檢查一般被視為安全。造影劑能提升身體器官和組織影像對比度。然而，偶爾亦可能出現併發症，其中包括：

輕微副作用
例如痕癢、蕁痲疹、作嘔、嘔吐、熱暖感覺、臂痛、打噴嚏、咳嗽等。

較嚴重的副作用
例如氣喘、心律不調、胸口痛、抽搐、腎衰竭、低血壓、昏迷等；這些副作用通常都需要醫生診治而機會率約為一萬分之四。

死亡
這種情況很罕有，機會率約為百萬分之二點一。

延遲性的副作用
很少病人會出現延遲性的副作用，症狀包括臂痛、痕癢、皮疹、唾液線疼痛 或腫脹等。

造影劑外滲
注射造影劑時有可能意外地由針口滲漏到手臂的軟組織，會引致局部腫痛；一般腫痛數日內會消失。嚴重的外滲情況有可能導致皮膚組織壞死。

與甲福明 Metformin 相關的併發症
正服用**甲福明 Metformin** 的糖尿病患者，若同時患有急性腎損傷 或 嚴重慢性腎病（第 IV 或 V 期；即 估算腎小球過濾率<30），造影劑會增加乳酸中毒的風險。建議應在接受造影劑檢查期間 及 於往後的 48 小時，暫停服用**甲福明 Metformin**。

備註
如病人對本檢查有任何疑問或有不清楚之處，請向本部門職員查詢。

參考資料

1. 智友站 (網址: www.21.ha.org.hk)
2. ACR Manual on Contrast Media (Version 10.3, 2024)

免責聲明
本醫療程序須知所提供的資訊僅供一般參考之用，上述風險與併發症並非全部，詳情請諮詢您的主診醫生。

本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名	簽署	家屬關係 (如適用)	日期