



醫療程序須知-  
眼底螢光血管造影術

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /  
affix patient's label

**簡介**

- 眼底螢光造影術是一個簡單、安全、有效的檢查視網膜（眼底）方法。
- 從觀察各拍攝眼底血液循環的過程，醫生能夠更準確地診斷病情及計劃合適的治療方案。此方法可適用於不同的視網膜病變，包括有炎症、水腫、血管異常、瘤腫或一些系統性疾病如糖尿病及血壓高等。

**檢查過程**

1. 首先滴擴瞳眼藥水扎瞳孔放大。
2. 將螢光劑注射入手臂的血管。
3. 注射螢光劑時可能引致短暫作悶作嘔情況，但無大礙。用特別的照相機拍攝眼底照片。
4. 整個過程需時約三十至四十分鐘，閃光燈的強光會使眼睛感到短暫不適。

**檢查前注意事項**

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 螢光劑可能影響胎兒，因此孕婦應避免接受此檢驗。
3. 約萬分之一的病人對螢光劑有嚴重過敏反應，導致呼吸困難、休克、甚至有生命危險。凡對藥物或食物有過敏或心臟病患者，檢查前應先通知醫護人員。

**檢查後注意事項**

1. 因放大瞳孔的關係，當日的視力會模糊，特別是看近的事物。因此檢查當日不宜駕駛。
2. 配戴太陽眼鏡可以減低擴瞳後的畏光現象。
3. 螢光劑會導致當日的小便、皮膚、眼白呈黃色。請多喝開水，使螢光劑經由小便排出體外。

**備註**

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

**參考資料**

醫院管理局「智友站」

\_\_\_\_\_ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期