

免責聲明:

- 病人持有化驗表格前來病理部抽血，即視作授權及同意本部門處理其樣本及進行測試等相關程序。
- 根據世界衛生組織指引:
 - 抽血後的不良反應包括疼痛、瘀傷、暫時性的神經損傷及頭暈。
 - 出現嚴重不良反應如失去知覺等，則機會甚微。
- **如有疑問，可向醫護人員查詢。**

1

抽血前準備



曾經抽血時有暈眩身體不適或過敏歷史(如對酒精過敏)，請於抽血前通知抽血人員，以便做好預防措施。



2

抽血後之護理

- A. 病人須以手指緊壓抽血部位上之棉球 **5-15分鐘**，不可揉搓或屈曲，以免造成血腫瘀青現象。凝血功能較弱的病人或服食通血管藥的病人應按壓較長的時間。抽血部位應緊壓直至沒有滲血，才貼上膠布，並確保沒有不適才離開。
- B. 建議**當天**內避免提重物及在穿刺位置上量血壓。
- C. 如出現頭暈、乏力等現象，應平臥至症狀緩解後才離開。



3

靜脈抽血可能會有痛楚和麻痺的風險，穿刺傷口如有任何異狀，請立即通知本院醫護人員及主診醫生。

