



醫療程序須知- 傾斜床檢查

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

有些病人有經常性暈厥或失去知覺的問題，原因甚多。其中一種原因是血管迷走神經性暈厥，是一類自主神經系統的問題。其機制是身體對腎上腺素的刺激產生不正常反應，使血壓和心跳突然下降，引致暈厥。傾斜床檢查（簡稱檢查）可診斷病人是否患有血管迷走神經性暈厥。在檢查中，病人會躺臥一張可調校傾斜角度的牀上；由平臥轉換至站立，再加上藥物注射，都可增加腎上腺素，以嘗試引發暈厥症狀及體徵。

檢查的重要性

此檢查能準確診斷血管迷走神經性暈厥。一經診斷，可能有針對性之治療。如你拒絕參與檢查，我們或不能為你準確判斷暈厥的原因。現時並沒有其他檢查方法可準確診斷血管迷走神經性暈厥，但若暈厥屬其他原因，則仍可使用其他檢查方法。

檢查過程

1. 你首先要平臥在傾斜牀上。
2. 護士會用束縛帶將你固定。
3. 護士會定時幫你監察血壓及心電圖。
4. 平臥一段時間後，傾斜床（與你）會被調校至差不多直立位置。相應地你會站立在一塊板臺上，並保持此位置一段時間。
5. 若你站立時出現症狀如暈厥或休克或血壓驟降，我們會立即將你調回平臥位置及停止檢查。通常你很快便會復原。
6. 若你站立時沒有暈厥症狀及體徵，醫生或會從靜脈逐步遞增藥物份量（通常是異丙基腎上腺素），並重複更換水平及直立位置 2-3 次。當藥物被注入時，你可能有心跳或惡心之反應。
7. 除異丙基腎上腺素外，醫生或會選擇讓你於站立時舌下含服定量的硝酸甘油再進行檢查，你可能會有頭痛或惡心之反應。
8. 檢查室設有足夠的醫療設備，以作不時急救之需要。

檢查風險或併發症

- 暫時性心臟停頓
- 注射的藥物可引致心跳紊亂及心臟病突發。

檢查前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 檢查主要為門診檢驗，通常無須入院。
3. 請依醫生指示是否需要停止藥物。
4. 最好有親友陪同。
5. 檢查前 4-6 小時不可進食。
6. 我們會為你進行靜脈輸液。



醫療程序須知- 傾斜床檢查

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

檢查後注意事項

你需要休息二十至三十分鐘，得到醫護人員同意始可離開。

備註

1. 本單張只提供有關檢查的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。
2. 若有併發症發生，可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。
3. 如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期