



醫療程序須知- 心包穿刺術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

簡介

心包積液乃指心臟外圍的薄膜有積水。成因包括細菌感染、發炎、惡性腫瘤、代謝疾病、充血性心力衰竭，創傷等等。心包積液會阻礙心臟擴張，引致功能受損。急性積液會導致急性肺水腫，休克或突發死亡。心包穿刺引流積液是經皮下穿刺介入方法。醫生通常使用心臟超聲波導引，放入引流管引出積液。

手術的重要性

心包穿刺引流積液有兩項功效。第一，積液清除後，心臟功能可回復正常。第二，積液的化驗有助瞭解病情。有急性積液時更需緊急穿刺引流。若拒絕是項手術，病者的病情會加速惡化。病者可選擇外科手術打開心包作另類治療。

手術過程

1. 醫生會使用心臟超聲波以確定穿刺位置。通常是劍突位置以下，或心尖位置。
2. 手術部位會進行消毒。
3. 穿刺位置會進行局部麻醉。
4. 醫生會將刺針刺入心包，並經刺針放入鋼絲。再經鋼絲放入引流管，引流管外接消毒容器。心包積液會被引流出體外。
5. 積液會作進一步化驗以瞭解病因。

手術風險或併發症

嚴重併發症包括：

- 心壁破穿
- 心臟病發
- 死亡
- 肝臟受損
- 氣胸
- 嚴重出血

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 醫生會替你做心臟超聲波，以確定心包積液的位置，程度及臨床重要性。
3. 我們會監測你的血壓，心跳及心電圖。你亦可能需要靜脈輸液。
4. 若手術乃非緊急，而你正服用薄血藥，可能需要於手術前數天停藥。如遇緊急情況，我們會使用特效藥以中和薄血藥性能。



醫療程序須知-
心包穿刺術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Please fill in /
affix patient's label

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

手術後注意事項

甲、術後處理

1. 引流管會持續保留，直至積液全部排出或心包再沒積液。可能需時數天。
2. 醫生有可能移動引流管以方便積液排出。
3. 醫生會利用心臟超聲波確定心包積液情況。

乙、術後跟進

1. 引流管移除後，傷口會蓋上消毒紗布。請保持傷口清潔，沐浴時請避免弄濕紗布。如紗布被弄濕，請立即更換。
2. 醫生會向你解釋手術結果及商討治療計劃。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。若有併發症發生，可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期