



## 醫療程序須知- 支氣管鏡檢查

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /  
affix patient's label

### 簡介

支氣管鏡檢查是用一支柔軟幼細的內視鏡，從鼻孔、口腔或者呼吸管放進，令醫生可以檢查病人的氣管及支氣管。

### 適應症

- 進行治療
  - 移除阻塞氣管/ 支氣管的異物或濃痰
  - 為肺部/ 氣管/ 支氣管進行止血
- 取得診斷
  - 抽取痰液或肺部組織進行化驗（尋找細菌/ 病毒/ 癌症細胞）
  - 找出肺部/ 氣管/ 支氣管出血位置
  - 找出胸部 X 光異常原因
  - 找出聲音沙啞的原因
  - 檢查呼吸管/ 氣管. 支氣管有沒有阻塞
- 其他
  - 確定呼吸管的位置
  - 輔助進行氣管造口手術

### 檢查過程

在檢查前，醫生先給病人注射適量的鎮靜劑或噴入局部麻醉劑，此能減低病人的焦慮及檢查時所引起的不適。醫生隨即將一支直徑為 3.1mm 至 4.2mm 之內鏡經鼻孔、口腔或呼吸管放進體內檢查。檢查期間，病人一般會處於昏睡的狀態。視乎病人情況，一般來說，整個檢查需時約 10-30 分鐘。在一些複雜的個案而需要特別治療者，所需之時間將會更長。

### 檢查風險或併發症

- 心律不整
- 輕微氣胸，約 1%，通常自行恢復
- 嚴重氣胸，約 0.5%，需要使用引流。
- 咳血，大量出血約 0.22%
- 呼吸道感染機會極微
- 使用鎮靜藥物後，有可能導致低血壓、壓抑呼吸、休克和過敏

### 檢查前注意事項

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 病人須於內鏡檢查前最少 6 小時禁食。
3. 抽血用作進行血氧含量和凝血指數分析。
4. 病人如有其他疾病，如糖尿病、高血壓、心臟病或懷孕等，須告知醫護人員並按指示服藥。
5. 把你的藥物敏感情況、常服藥物或其他醫療情況告訴你的醫生
6. 病人如果有可移除的假牙，將會在檢查前移除。



醫療程序須知- 支氣管鏡檢查

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

Please fill in /  
affix patient's label

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

**檢查後注意事項**

1. 根據醫生的決定，檢查後可能需要禁食一段時間。
2. 若曾抽取肺組織，檢查後或需接受肺部 X 光檢查。
3. 如果病人在檢查時有接受鎮靜劑注射，可能會覺得嗜睡或頭暈，建議病人臥床休息。
4. 檢查後病人可能感覺輕微咽喉痛或咳嗽帶血絲。

**其他治療**

病人如選擇不進行這程序，或會影響其整體的病情，而病情的變化是受多種臨床因素影響，包括個別病人發病前的身體狀況、病情種類、對治療的反應及進展等。醫生會向你解釋其他合適的選擇。

**備註**

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

**參考資料**

醫院管理局「智友站」

.....  
\_\_\_\_\_ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期