



醫療程序須知- 膠囊內鏡檢查

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

1. 小腸是十分長的器官，過往診治小腸的疾病相當困難，但隨著近年發明的膠囊內視鏡檢查，這個困難終於得以解開。
2. 膠囊內視鏡是一嶄新的儀器，它的體積約為一粒較大的藥丸，而內藏小型攝影機，無線傳送器及電池。當病人把膠囊內視鏡吞下後，它會隨著腸道蠕動進入小腸，並在小腸內拍攝約 65000 張照片。影像會以無線傳輸方式傳至體外的記錄儀，病人可在沒有任何痛苦的情況下進行小腸檢查。醫生透過電腦分析記錄儀上的影像便可得出準確的診斷。
3. 近年膠囊內視鏡的發展已擴展至食道及結腸檢查，可取代部分入侵性的內視鏡檢查。

適應症

1. 小腸膠囊內視鏡主要用於診斷以下的疾病：
 - 隱性或顯性的腸胃道出血
 - 不明原因的鐵質缺乏性貧血
 - 懷疑患上小腸腫瘤或息肉等
 - 懷疑及跟進腸道克隆氏病（炎症性腸病）
2. 食道膠囊內視鏡主要用於診斷以下疾病：
 - 懷疑患上食道靜脈曲張（因肝硬化引起）
 - 懷疑及跟進因胃食道反流病（胃酸倒流）併發的發炎及巴洛氏（Barrett's）食道病變（癌前病變）
3. 結腸膠囊內視鏡主要用於診斷以下疾病：
 - 懷疑患上結腸癌症或息肉
 - 懷疑患上炎症性腸病
 - 過往的結腸內鏡檢查未能診斷的病症
 - 作為結腸癌症普查的一種方法

檢查過程

1. 在檢查前，護士會在病人身上不同部位貼上接收儀器及在腰間帶上數據記錄儀。
2. 其後護士會交給病人一粒膠囊內視鏡用水吞下，來訪便正式開始。
3. 服下膠囊內視鏡，護士會用監控儀確認膠囊內視鏡是否已進入胃部。
4. 如膠囊內視鏡已進入小腸，病人可離開內視鏡中心。
5. 吞服膠囊 2 小時內不能進食或飲水。兩小時後，病人便可恢復飲用無色飲料。
6. 檢查 4 小時後，可以吃小量簡單餐。
7. 檢查期間，病人每 15 分鐘確認記錄儀上部的綠/藍色燈是否閃爍，如停止閃爍，需通知病房護士或內鏡中心。
8. 攝錄小腸過程需時約 8 小時，再由護士把記錄儀除下，其間可以自由走動。食道膠囊內視鏡檢查則只需 30 分鐘。

檢查風險或併發症

膠囊內視鏡檢查是非常安全的。檢查期間病人不會有任何感覺。在少數腸道有狹窄的病人中，腸膠囊內視鏡或不能通過狹窄處而停留在腸道中，或會因此出現腸道閉塞現象。病人或需要接受小腸內視鏡將膠囊拿出，或接受手術治療。



醫療程序須知- 膠囊內鏡檢查

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

檢查前注意事項

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 在進行小腸膠囊內視鏡檢查前，需按醫生指示於檢查前的晚上八時開始，在進食輕量晚餐後，飲用 2 公升的清洗腸臟藥水。午夜十二時後需要禁止飲食。如病人正在用 Rifampicin, Pyridium 或 Ferrous sulfate，請於檢查前七天停服。
3. 在進行結腸膠囊內視鏡前三天不要進食高纖食物（例如：水果、蔬菜及瓜類食品）。在檢查前一天需按醫生指示飲用二至四公升的放瀉藥水，否則檢查無法進行。在檢查當天只可飲用清水。如你因對放瀉藥物有強烈反應致有冒汗、心悸、嘔吐、頭暈、腹絞痛及劇烈腹瀉等等，請停止服用瀉藥及馬上通知你的主診醫生或護士。
4. 如要進行食道膠囊內視鏡檢查，只需在檢查前禁食 6 小時即可。
5. 病人如有其他疾病，須告訴醫護人員並聽從指示服藥。

檢查後注意事項

1. 在檢查結束後，可正常飲食。
2. 於膠囊內視鏡排出前，不能接近任何強力電磁區域，如磁力共振儀器或發電站。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

.....
_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期