



醫療程序須知- 包皮環切術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

簡介

包皮環切術是指切除覆蓋陰莖頭的包皮和黏膜組織的外科手術，傷口用可吸收性縫線縫合。在手術後，陰莖頭便不會再被包皮覆蓋。在手術進行中如發現其他先天結構異常現象，便可能需要施行額外手術，但此等情況非常罕見。在此等情況下，醫生須要立即將額外施行手術的具體細節告知父母。

適應症

1. 包莖（包皮過小/緊，令陰莖頭不能外露）
2. 包莖嵌頓（包皮口緊束在陰莖頭上方的冠狀溝處，未能及時復位）
3. 復發性陰莖頭炎
4. 以及泌尿系統異常而容易導致泌尿道感染

手術過程

1. 手術須在局部麻醉或全身麻醉下進行。
2. 切除適當長度的包皮。
3. 採用可吸收性縫線縫合傷口。
4. 敷料輕輕包著陰莖。

手術風險或併發症

甲、麻醉併發症

乙、手術後初期

1. 傷口感染
2. 傷口大量出血
3. 泌尿道感染
4. 結痂及分泌物滲出
5. 急性尿貯積/小便滯留（因傷口疼痛而排尿不清）
6. 傷口裂開

丙、手術後後期（罕見）

1. 尿道口狹窄（因感染及隨後出現的疤痕而導致尿道口變窄）
2. 陰莖出現大面積疤痕
3. 皮贅及皮橋
4. 包皮環切術傷口疤痕出血
5. 陰莖彎曲
6. 陰莖陷入
7. 勃起緊繃、疼痛
8. 心理及性心理障礙

*部份併發症可能需要跟進治療或另外手術處理

手術前注意事項

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 依照麻醉科醫生的指示禁食。
3. 患者一般在手術前6小時禁食或禁水。
4. 在特殊情況下，麻醉科醫生有可能取消手術。
5. 局部陰莖麻醉可緩減環切術後疼痛。



醫療程序須知- 包皮環切術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Please fill in /
affix patient's label

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

手術後注意事項

甲、住院護理

- 切勿自行在傷口上塗上藥膏或用其他消毒藥水洗傷口。
- 最好穿著袍子，不穿內褲。
- 傷口不蓋紗布，只用開口的紙杯覆蓋，避免衣服及被單磨擦。
- 如傷口有大量出血，請通知醫護人員。
- 勿試圖除去傷口的痂，傷口癒合後痂會自動脫落。
- 手術後可以洗澡，但不宜浸浴及用肥皂塗在傷口部位。
- 請保持個人衛生。

乙、出院後家居護理

- 傷口會有浮腫現象，1-2 星期內便會消失。
- 傷口約 7-10 天可以痊癒。
- 切勿穿緊身褲，直至傷口痊癒。
- 要注意個人衛生及保持傷口清潔乾爽。
- 每次小便後，請用蒸餾水或冷開水沖洗傷口。
- 傷口如有異味、流膿、大量流血、長期紅腫、小便持續痛楚及排便困難等現象，請盡快求診。
- 遵照醫生指示，請按時覆診。
- 如成年人，4-6 星期內禁慾（包括自瀆），直至傷口完全癒合。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

.....
_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期