



醫療程序須知 -
陰道切開「巴托林腺」放膿造袋術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

巴托林腺位於陰道口。當腺管被阻塞或被感染時，便會導致巴托林腺囊腫出現。急性發作期可能形成膿腫。放膿造袋術是一種常見的手術用以治療巴托林腺囊腫，透過手術建造造袋以供液體排出。

適用情況

1. 外陰部位出現紅腫及疼痛
2. 當行走、坐着或進行性行為時會感到不適
3. 未能確診病情及囊腫的性質

手術過程

1. 全身或局部麻醉
2. 切石臥位姿勢
3. 於囊腫開出小切口
4. 排出液體
5. 將內囊壁被折回並縫合到皮膚上建造小造袋
6. 除非特別聲明，囊腫物會送交病理部作細菌培植及藥物敏感測試

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

- A. 可能出現的風險或併發症（可能發生的風險或併發症不能盡錄）：
1. 麻醉併發症
 2. 傷口併發症，如出血及感染
 3. 復發

手術前注意事項

1. 主診醫生會與病者解釋施行手術的原因、過程及可能出現的併發症
2. 病者明白後需簽署手術同意書以示同意
3. 若全身麻醉，手術前 6 小時開始禁食
4. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除
5. 手術前排清小便

手術後注意事項

1. 手術後數星期內，可能會有輕微傷口出血或滲液、陰道出血或分泌
2. 請根據醫囑服用處方之藥物
3. 若陰道持續出血、流出惡臭分泌物、嚴重疼痛、寒顫、發熱 (體溫 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況，請盡快與你的醫生聯絡或求醫
4. 在恢復性行為之前，請先諮詢你的醫生

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

Folashade Omole, M.D., Barbara J. Simmons, M.D., and Yolanda Hacker, M.D. Am Fam Physician. 2003 Jul 1; 68(1):135-140.

醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期