



醫療程序須知 - 子宮肌瘤切除術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

Please fill in /
affix patient's label

簡介

子宮肌瘤是良性的平滑肌瘤，單發或多發生長在子宮壁上，常引起疼痛和月經過多，並可長得極大。雖沒有生命危險，但影響懷孕。患此病婦女通常是三十歲或以上。可做外科手術切除。多數情況下，若無不適及其他症狀，便無需外科手術。

適應症

- 月經量多引致貧血
- 盆腔腫瘤
- 器官受壓病徵

預期得到的效果

- 舒緩脫垂的病徵
- 可能舒緩小便、大便的困難

手術過程

1. 全身麻醉
2. 進入腹腔。
3. 分離肌瘤及切除
4. 縫合子宮切口及腹部傷口
5. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理

手術風險或併發症

此手術會有一定風險，包括：

- 麻醉的併發症
- 可能大量出血而需要輸血
- 損傷鄰近器官，例如：膀胱，輸尿管和腸道
- 可能需要切除子宮 (1-2%)
- 若是子宮腺肌症或肌瘤太小／太深，手術未必可行及完成。
- 盆腔感染
- 傷口的併發症有包括感染、小腸氣等
- 深層靜脈栓塞
- 子宮肌瘤將來可能復發
- 將來雖可以懷孕但有子宮破裂的危險
- 將來可能需要剖腹生產

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 抽血作檢驗。
3. 手術前 6-8 小時開始禁食。
4. 遵照醫生指示，如有需要會進行迅速灌腸，清除糞便。
5. 遵照醫生指示，如有需要，剃除下體毛髮。

手術後注意事項

1. 術後及康復期間，避免提起過重的物件，直至得到醫生的建議才可。
2. 如嚴重腹痛、傷口滲膿、陰道大量出血或發熱(如體溫 38°C or 100°F或以上)等，請盡快與醫生聯絡。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

香港大學婦產科學系

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽名

關係 (如適用)

日期