



醫療程序須知 - 宮外孕

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

簡介

胎兒的生長不在子宮內腔。宮外孕是導致孕婦在早期懷孕時死亡的主要原因。

適用情況

輸卵管宮外孕 或 非輸卵管宮外孕。

治療方法

1. 內科治療

- 注射藥物如細胞毒素藥物
- 只適合某類病者
- 後隨多次「人類絨毛膜促性腺激素」水平檢驗及超聲波檢查

2. 外科治療

- 當體內有出血情況或輸卵管隨時可能爆裂
- 當內科治療無效
- 當多次「人類絨毛膜促性腺激素」水平檢驗仍未達到理想的下降速度或水平

手術過程

1. 全身麻醉
2. 使用腹腔鏡輔助，或於腹腔製造一個小切口
3. 將藏有胚胎組織的輸卵管切除，或切開輸卵管後抽吸胚胎組織
4. 縫合腹部傷口
5. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

可能出現的風險或併發症（可能發生的風險或併發症不能盡錄）：

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. 麻醉併發症 | 4. 盤腔感染 |
| 2. 出血，可能需要輸血 | 5. 傷口併發症 |
| 3. 損傷附近器官如膀胱、輸尿管、腸道及腹腔內血管，以致需要修補 | 6. 將來再發生宮外孕的風險增加 |

手術前注意事項

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. 主診醫生會與病者解釋施行手術的原因、過程及可能出現的併發症 | 3. 手術前 6 至 8 小時開始禁食 |
| 2. 病者明白後需簽署手術同意書以示同意 | 4. 抽血作檢驗 |
| | 5. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除 |



醫療程序須知 - 宮外孕

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

手術後注意事項

1. 請根據醫囑服用處方之藥物
2. 若嚴重腹痛、傷口流膿、陰道大量出血、發熱 (體溫 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況，請盡快與你的醫生聯絡或求醫
3. 接受內科治療時，應避免性交。治療完畢後，應採用有效的避孕方法，避免於 3 個月內懷孕

不接受手術或內科治療無效的風險

器官破裂引致內出血，令循環血容量減少而引致休克，甚至死亡。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

香港大學婦產科學系

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期