



醫療程序須知 -
宮腔鏡肌肉瘤 / 息肉切除術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

透過使用帶有光源的管形器械，經子宮頸進入子宮內腔，進行觀察及可進行肌瘤或息肉切除。

適用情況

1. 不正常子宮出血
2. 子宮內腔變形
3. 子宮肌瘤或息肉
4. 取出殘留子宮環
5. 子宮內膜增厚，懷疑子宮內膜病變
6. 宮腔黏連

手術過程

1. 全身或區域性麻醉
2. 擴張子宮頸
3. 放入切除鏡
4. 注入甘氨酸或生理鹽水以膨脹宮腔
5. 宮腔鏡直接監察子宮內腔
6. 切除病變，可能用超聲波輔助
7. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

可能出現的風險或併發症（可能發生的風險或併發症不能盡錄）：

1. 麻醉併發症
2. 出血 (不普遍, 0.5%)，可能需要輸血
3. 盤腔感染
4. 子宮頸撕裂
5. 甘氨酸攝入過多
6. 子宮穿孔，可能損傷附近器官如膀胱、腸道及腹腔內血管，以致需要修補
7. 未能完成切除，可能需要再接受手術
8. 復發

手術前注意事項

1. 施行手術的理想時間是月經週期剛結束後
2. 抽血作檢驗
3. 主診醫生會與病者解釋施行手術的原因、過程及可能出現的併發症
4. 病者明白後需簽署手術同意書以示同意
5. 如全身麻醉，手術前 6 至 8 小時開始禁食
6. 遵照醫生指示，如有需要，下體毛髮將剃除

手術後注意事項

1. 手術後 2 星期內，可能會有陰道出血
2. 若嚴重腹痛、傷口流膿、陰道大量出血、發熱 (體溫 38°C 或 100°F 以上) 或其他異常情況，
3. 生育期內的病人會回復過往的月經週期

請盡快與你的醫生聯絡或求醫

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

香港大學婦產科學系

醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期