



醫療程序須知 -
鼻骨骨折閉合性復位術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN *Please fill in / affix patient's label*

簡介

矯正偏曲的鼻骨

適用情況

1. 鼻骨偏曲引起的鼻塞
2. 改善歪鼻骨

預期結果

1. 減輕鼻塞
2. 改善歪鼻骨

手術不能解決的問題

1. 非鼻骨偏曲導致的鼻塞

手術過程

1. 鼻骨復位
2. 通常會使用鼻外夾板固定位置

手術風險或併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 手術儀器或植入物可能會在手術過程中崩脫及殘留在手術部位。

常見副作用和併發症 (≥1%風險)

1. 出血
2. 感染
3. 鼻腔粘連
4. 持續鼻塞
5. 鼻中隔血腫
6. 持續鼻畸形

不常見的嚴重風險或併發症 (<1%風險)

1. 使用鼻敷料或導致中毒性休克
2. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症。病人將需要簽署手術同意書。
2. 告訴醫生你的醫療及服藥情況，藥物可能需要作恰當的增減。
3. 手術前 6-8 小時開始禁食。
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等。



醫療程序須知 - 鼻骨骨折閉合性復位術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

手術後注意事項

1. 手術後可能要服用止痛藥。
2. 可能會有輕微鼻出血，但假如情況持續應前往就近急症室求診。
3. 睡覺時頭部略為墊高，有助減少手術後出現水腫情況。
4. 不應擤鼻。
5. 在手術後數星期應避免進行劇烈運動或接觸球類體育運動。
6. 遵照醫生指示按時覆診。

其它治療方法

1. 觀察病情進展，再作打算。

不接受治療的後果

1. 持續鼻塞
2. 持續鼻變形

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局 - 「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期