



## 醫療程序須知 - 乳突切除術

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /  
affix patient's label*

### 簡介

切除中耳及乳突氣房病灶

### 適用情況

1. 膽脂瘤
2. 急性乳突炎
3. 慢性化膿性中耳炎和乳突炎
4. 腫瘤

### 預期結果

1. 清除膽脂瘤
2. 處理中耳和乳突感染
3. 有機會不能完全減輕症狀和有可能復發
4. 清除腫瘤

### 手術不能解決的問題

1. 耳鳴
2. 暈眩
3. 弱聽

### 手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行
2. 皮膚切口會在耳前或耳後
3. 乳突內的病灶會在顯微鏡下切除
4. 在大多情況下，手術後傷口需加壓包紮
5. 如有需要會用面神經顯示監察



## 醫療程序須知 - 乳突切除術

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /  
affix patient's label*

### 手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

### 常見副作用和併發症 (≥1%風險)

1. 復發或殘留
2. 感染
3. 出血
4. 傳導性弱聽加重
5. 失去味覺或味覺紊亂
6. 對耳道填塞物過敏
7. 暈眩

### 不常見的嚴重風險或併發症 (<1%風險)

1. 面癱
2. 失去部份或全部聽力
3. 耳道狹窄
4. 耳廓變形
5. 顱內損傷，導致腦脊液漏，感染和出血
6. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

### 手術前準備

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
2. 手術前可能需要剃除耳朵旁邊毛髮。

### 手術後注意事項

1. 耳朵可能會出現痛楚或阻塞的感覺。
2. 壓力敷料通常會在一日後拆除，請切勿自行拆除耳內敷料。醫生在覆診時，會替你更換或拆除敷料。
3. 耳朵排出一些分泌物乃屬正常，請切勿讓水流入耳內。



## 醫療程序須知 - 乳突切除術

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /  
affix patient's label*

### 其它治療方法

1. 定期耳道清潔和藥物治療
2. 抗菌素滴耳

### 不接受治療的後果

疾病惡化和出現併發症

### 備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

醫院管理局「智友站」

\_\_\_\_\_ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期