



醫療程序須知 - 下鼻甲減容術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

簡介

切除下鼻甲

適用情況

下鼻甲肥大引致的鼻塞

預期結果

1. 緩解鼻塞
2. 有機會不能完全減輕症狀和有可能復發

手術不能解決的問題

1. 非下鼻甲肥厚引致的鼻塞

手術過程

1. 醫生會以手術儀器經鼻孔切除鼻腔內肥大的下鼻甲，然後進行止血

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

常見副作用和併發症 (≥1%風險)

1. 出血
2. 感染
3. 鼻腔粘連
4. 持續鼻塞
5. 暫時痂皮

不常見的嚴重風險或併發症 (<1%風險)

1. 萎縮性鼻炎
2. 咽鼓管損傷
3. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及手術同意書
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況，藥物可能需要作恰當的增減
3. 手術前 6-8 小時開始禁食
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等



醫療程序須知 -
下鼻甲減容術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

手術後注意事項

1. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料，所以你可能要用口呼吸，敷料會於一至兩天後取走
2. 取走敷料後可能有輕微出血，但通常都會自行止血
3. 敷料取去後，你可以出院回家。鼻水帶有少量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續不止，請前往最近的急症室求診
4. 遵照醫生指示按時覆診

其它治療方法

1. 藥物治療

不接受治療的後果

2. 持續鼻塞

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期