



**醫療程序須知 -  
鼻中隔成型術/粘膜炎下隔切除術**

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

*Please fill in /  
affix patient's label*

**簡介**

矯正彎曲的鼻中隔

**適用情況**

1. 鼻中隔彎曲引起的鼻塞
2. 鼻竇竇口引流阻塞導致的鼻竇炎
3. 鼻出血
4. 鼻中隔刺引致的頭痛
5. 鼻中隔彎曲，引致的歪鼻畸形
6. 其它鼻手術進道

**預期結果**

1. 減輕鼻塞
2. 減輕竇口阻塞
3. 減少鼻出血
4. 緩解鼻中隔刺導致的頭痛
5. 改善歪鼻畸形
6. 有機會不能完全矯正和有可能復發

**手術不能解決的問題**

1. 非鼻中隔彎曲導致的鼻塞
2. 過敏性鼻炎導致的症狀如鼻癢、噴嚏、鼻液倒流

**手術過程**

1. 醫生透過鼻內的切口，以撼動、重新定位及切除等方式糾正彎曲的鼻中隔

**手術風險或併發症**

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

**常見副作用和併發症 (≥1%風險)**

1. 出血
2. 感染
3. 鼻塞
4. 鼻腔粘連
5. 鼻中隔血腫
6. 鼻中隔穿孔

**不常見的嚴重風險或併發症 (<1%風險)**

1. 鼻樑塌陷 / 鼻小柱內陷
2. 失去嗅覺
3. 腦髓液鼻漏
4. 中毒性休克
5. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡



醫療程序須知 -  
鼻中隔成型術/粘膜炎下隔切除術

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /  
affix patient's label

**手術前準備**

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及手術同意書
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況，藥物可能需要作恰當的增減
3. 手術前 6-8 小時開始禁食
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等

**手術後注意事項**

1. 手術後醫生會於手術的一邊或兩邊置入鼻敷料，你可能需要用口呼吸。鼻內敷料會於一兩日後取走
2. 取走敷料後可能有輕微出血，但通常都會自行止血
3. 敷料取去後，你可以出院回家。鼻水帶有小量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續不止，請前往最近的急症室求診
4. 遵照醫生指示按時覆診

**其它治療方法**

藥物治療

**不接受治療的後果**

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. 持續鼻塞   | 3. 復發性鼻出血   |
| 2. 鼻竇炎併發症 | 4. 持續頭痛及鼻畸形 |

**備註**

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

**參考資料**

醫院管理局「智友站」

\_\_\_\_\_ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期