



醫療程序須知 - 扁桃體切除術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

*Please fill in /
affix patient's label*

簡介

切除扁桃體

適用情況

1. 復發性或慢性扁桃體炎
2. 扁桃體周圍膿腫
3. 阻塞性睡眠窒息綜合症或鼻鼾症
4. 活組織檢查
5. 扁桃體惡性腫瘤
6. 手術進路

預期結果

1. 減少扁桃體/咽喉感染
2. 減輕睡眠窒息或打鼻鼾
3. 病理診斷
4. 有機會不能完全減輕症狀和有可能復發

手術不能解決的問題

1. 非扁桃體引致的咽喉問題

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行
2. 醫生會經口腔切除扁桃體

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

常見副作用和併發症 (≥1%風險)

1. 疼痛
2. 感染
3. 出血
4. 口腔/口咽部損傷

不常見的嚴重風險或併發症 (<1%風險)

1. 牙齒損傷
2. 下頷損傷
3. 聲音改變
4. 上呼吸道阻塞
5. 術後肺水腫
6. 頸椎損傷
7. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及手術同意書
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況，藥物可能需要作恰當的增減
3. 手術前 6-8 小時開始禁食
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等



醫療程序須知 - 扁桃體切除術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Please fill in /
affix patient's label

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

手術後注意事項

1. 手術後會出現喉痛及少許吞咽困難，情況會持續數日。
2. 唾液帶小量的血乃屬正常。假如出現持續口腔出血，請立即前往就近急症室求診。
3. 遵照醫生指示按時覆診

其它治療方法

1. 抗生素治療感染
2. 持續正壓呼吸機治療阻塞性睡眠窒息綜合症
3. 放射治療或化療治療惡性腫瘤

不接受治療的後果

1. 復發性扁桃體炎或扁桃體周圍膿腫復發和出現併發症
2. 阻塞性睡眠窒息綜合症的併發症
3. 不能準確診斷腫瘤

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期