



醫療程序須知 - 垂腭咽成型術 /
激光輔助腭咽成型術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

簡介

1. 懸壅垂、軟腭及扁桃體切除
2. 激光手術輔助腭咽成型

適用情況

1. 阻塞性睡眠窒息綜合症
2. 鼻鼾症

預期結果

1. 減少睡眠窒息
2. 減少打鼻鼾
3. 有機會不能完全減輕症狀和有可能復發

手術不能解決的問題

1. 非腭咽狹窄引致的氣道阻塞

手術過程

1. 手術會在全身或局部麻醉下進行
2. 醫生會經口腔切除部份軟腭組織，同時或會一併切除扁桃體

手術風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

常見副作用和併發症 (≥1%風險)

1. 疼痛
2. 出血
3. 喉部不適和後鼻漏
4. 感染
5. 激光有關的併發症

不常見的嚴重風險或併發症 (<1%風險)

1. 腭咽閉合不良，引致進食和喝水時液體返噎、發音改變
2. 氣道阻塞和呼吸困難
3. 腭咽狹窄引致呼吸困難、打鼻鼾、睡眠窒息和發音改變
4. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡

手術前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及手術同意書
2. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況，藥物可能需要作恰當的增減
3. 手術前 6-8 小時開始禁食
4. 更換上入手術室的衣物及除去身上能鬆脫的物品，如假牙、飾物或隱形眼鏡等



醫療程序須知 - 垂腭咽成型術 /
激光輔助腭咽成型術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

手術後注意事項

1. 手術後數天內，你會有喉痛及少許吞嚥困難
2. 唾液帶小量的血乃屬正常。假如出現持續口腔出血或嚴重喉痛，請立即前往就近急症室求診
3. 遵照醫生指示按時覆診

其它治療方法

1. 正壓呼吸機
2. 其它腭咽手術
3. 治療阻塞性睡眠窒息症的口腔裝置或齒科裝置

不接受治療的後果

1. 鼻鼾聲持續存在
2. 阻塞性睡眠窒息綜合症的併發症

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

_____ 醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期