



**醫療程序須知 -
腎臟/ 腎結節(經皮穿刺)活組織檢
查/ 細針吸取術**

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

1. 細針抽吸 / 活組織檢查術在臨床上用於鑒定腫塊或其他器官組織的異常變化。在活組織檢查術中，一根細針會在 X 光，超聲波或其他圖像監視系統的引導下經皮膚插入異常部位，抽取活組織樣本，送交病理科生診斷。由於必須通過皮膚進行，所以稱作經皮活組織檢查術。醫生或可用一根更幼細的針，吸出結節內的細胞或液體樣本作化驗，稱為細針抽吸。
2. 因為腎病或腎結節的性質有時不能單靠造影檢查或其他臨床檢驗作確定，所以細針抽吸 / 活組織檢查術能有助進一步診斷及治療。
3. 本檢查由富有經驗的專科醫生負責實施，本檢查通常在放射科以電腦掃描(CT)或超聲波等圖像監視系統指導下完成。

手術 / 程序過程

1. 本檢查將在局部麻醉和無菌操作下進行。護士會為病人消毒及鋪上經消毒的手術布。
2. 細針抽吸會透過一根幼細的針，經皮膚插入到結節內吸取細胞樣本。
3. 活組織檢查術會透過一根較粗的針，經皮膚插入到結節內吸取活組織樣本。活組織檢查術，一般會取出 2 個或以上之組織樣本以確保足夠的組織作詳細化驗。因粗針結構關係，在吸取活組織樣本時會發出「啪」的聲響。
4. 檢查術時間取決於每個病例的複雜度。儘管檢查可能只需要 30 分鐘，但病人停留在放射科的總時間可能會超過一小時。
5. 整個檢查術過程及前後，病人的生命體徵（如血壓、脈搏等）都會受到監察及記錄。
6. 病理科需要幾天的時間對取出的活組織進行一切必要的化驗。

手術 / 程序前須知

1. 病人需簽署手術同意書。
2. 如果病人懷疑可能或已經懷孕，請事先通知放射科職員。
3. 如病人曾對食物，藥物，局部麻醉藥或造影劑有過敏反應，請事先通知放射科職員。如有需要，可在檢查前接受類固醇藥療以減低注射造影劑後出現的不良反應。
4. 服用抗凝血藥病人，請遵照醫生指示調節藥份。
5. 檢查血凝結率，如有問題需要先矯正
6. 在檢查前 3 小時開始禁飲食。
7. 糖尿病人請遵照醫生指示調節藥份。
8. 按需要預先置入靜脈導管。



醫療程序須知 -
腎臟/ 腎結節(經皮穿刺)活組織檢
查/ 細針吸取術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Please fill in /
affix patient's label

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

風險及併發症

1. 患者可能會出現血尿 (常見)。
2. 腎外血凝塊聚集。如果持續出血，則需要輸血或作腎動脈支流栓塞術，這種情況 (少於 3%)。
3. 因出血導致的死亡 (極為罕見)。
4. 需要外科治療的感染或器官損傷 (罕見)。
5. 鄰近器官之創傷如肝臟，胰臟，大腸，肺部等 (罕見)。
6. 並不是所有的細針抽吸 / 活組織檢查術都是成功的。因為有診斷性病變的部份可能不被刺中，在化驗過程中亦可能會發覺組織樣本不足。在這些情況下，往往需要再作一次同類檢查。
7. 儘管存在發生併發症的危險，經皮細針抽吸 / 活組織檢查仍然是十分安全可靠的，它能使患者免去一些較大型的手術或檢查，亦可令患者因有確實診斷而迅速得到合適的治療。
8. 常見的併發症危險度較輕，嚴重的併發症則並不多見。
9. 造影劑可能引起的副作用。

一般風險

9.1 輕微反應

包括痕癢、作嘔、熱暖感覺、手痛、打噴嚏、咳嗽及少許呼吸困難。部份病人會較遲有反應通常會 24 小時內感到注射造影劑的靜脈注射位痛楚、痕癢、紅疹或唾液腺有腫脹。此等症狀維持短暫，不需或只需少許治療。

9.2 中度反應

反應症狀比較嚴重及維持比較長時間。病人會有紅疹，發燒，寒顫，血壓上升或下降，心悸。只是需要特別治療及觀察。

9.3 嚴重反應

反應包括氣促，心律不齊，心絞痛，急性腎衰竭，抽搐及昏迷。如有此等反應，必須立即治療。

若有併發症發生，可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。



醫療程序須知 -
腎臟/ 腎結節(經皮穿刺)活組織檢
查/ 細針吸取術

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. 香港介入放射醫學會病人資料單張：腎結節經皮細針吸取(FNA) / 腎活組織檢查術 (2010)
2. 醫管局「智友站」網頁：腎活組織檢查 (2008)

本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問, 並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期