



醫療程序須知 - 關節造影

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

介紹

1. 這項程序用以檢查各部份的關節位，如髖、膝、踝、肩、肘、腕、或頷關節。檢查時，醫生將造影劑注入關節內、以顯示該部位的韌、韌帶、軟骨或關節囊的病變。
2. 這項程序由放射科醫生在 X 光透視監察下進行。

過程中

1. 醫生首先會以消毒液清潔檢查部位，並進行局部麻醉。
2. 接著，醫生會以一枝針刺進病人將要檢查的關節，並將造影劑注入。
3. 之後醫生會將針移除，並請病人擺動關節，目的是令造影劑在關節內均勻分佈，然後會於不同位置進行 X 光拍攝。
4. 某些關節位 (如腕關節) 的造影檢查或需於在另一部位作第二次注射。
5. 檢查後，病人的關節或會感到浮腫，並且可能會維持數小時。
6. 此檢查程序或會輔以電腦掃描 / 磁力共振掃描 (CT/MRI)。

風險和併發症


1. 嚴重但不常見的併發症包括受感染或對造影劑出現過敏反應。
2. 較常見的併發症包括關節內出血。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. 智友站 (Website: <http://www21.ha.org.hk>)



本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問, 並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期