



醫療程序須知  
磁力共振

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:  
Patient No.: PN

*Please fill in /  
affix patient's label*

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

### 簡介

磁力共振檢查是一種安全、準確、並無輻射或痛楚的造影檢查。它是利用強力的磁場，無線射頻及精密的電腦科技，清楚地透視人體內部組織，為病人提供更準確的診斷。

### 檢查前

1. 一般的情況下，可以如常進食及服用醫生所處方之藥物，除腹部的檢查以外。
2. 檢查當日，應避免眼部化妝。
3. 病人若有任何一項下列的物件及狀況，請通知本中心職員。因在此情況下進行檢查，可能對病人產生危險及干擾檢查所得的影像。
  - a) 身體內裝有、植入或配戴下列器材/物件：

— 體內引流導管	— 人造內耳窩
— 心臟起搏器	— 假牙或補牙
— 人造心瓣	— 內置血管金屬性堵塞物、支架等
— 外科血管夾	— 金屬外物
— 內置胰島素注射器	— 子宮環
— 助聽器	— 骨科金屬釘、片或鏢絲
  - b) 現在或曾經從事五金行業。
  - c) 曾經被金屬碎片或子彈所傷。
  - d) 曾經被金屬碎片傷及眼部。
  - e) 現在或曾經有紋身或紋眉。
  - f) 現正或可能已懷孕。
4. 病人進入檢查室前需要除去身上所有金屬物品〔如眼鏡、手錶、頸鍊、扣針、髮夾等〕；另外，一些容易被強力磁場破壞之物品〔如信用卡、八達通卡等〕也應除下，放入病人專用的儲物櫃內，以策安全。
5. 懷孕首 3 個月應避免接受這項檢查。



醫療程序須知  
磁力共振

Visit No.: Dept.:  
Name: Sex/Age:  
Doc. No.: Adm. Date:  
Attn. Dr.:

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Patient No.: PN

*Please fill in /  
affix patient's label*

**進行檢查時**

1. 檢查過程需時 30 分鐘至 2 小時不等。在整個過程中，病人需要合作，固定身體。為此，小孩和嬰兒可能需要服用或注射由主診醫生處方的鎮靜劑。
2. 檢查進行中，儀器會間歇地發出大量噪音，本部門會提供耳塞或耳筒供病人使用，以減少噪音帶來的干擾。
3. 為確保病人在檢查進行中的安全，在磁力共振掃描室內，設有對講機。同時，工作人員會給病人一個緊急按鈕或橡皮球輕握在手中，當病人有需要時，可輕按發出訊號，與控制室的工作人員保持緊密聯繫。
4. 視乎情況，病人可能需要注射磁力共振造影劑。檢查所用的造影劑甚為安全，約 2% 病人可能會有頭痛、嘔吐、噁心等反應。嚴重反應而導致死亡的機會率約為四十萬分之一。
5. 在罕有的情況下，腎衰竭病人在接受含釷造影劑後，會出現系統性腎臟纖維化病變 (NSF)，亦曾有死亡病例。

**檢查後**

1. 在一般情況下，磁力共振檢查不會帶來不適，所以，檢查後可以如常工作。
2. 如病人對本檢查有任何疑問或有不清楚之處，請向本部門職員查詢。

**參考資料**

1. 智友站 (網址: <http://www.21.ha.org.hk>)
2. ACR Manual on Contrast Media (Version 10.3, 2018)
3. SPH Procedures on Magnetic Resonance Imaging (MRI) Safety (version 3.0, 2018)

本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問, 並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期