



醫療程序須知
前列腺正電子及電腦雙融掃描

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

前列腺特異性膜抗原 (PSMA) 是一種細胞表面蛋白，會在前列腺癌細胞中有明顯的增多。前列腺正電子及電腦雙融掃描 (PSMA PET-CT) 可偵測原發性和轉移性前列腺癌，有望對原發性前列腺癌進行準確的分期。即使較低的 PSA 值，也可以清晰區分復發的淋巴腺和骨骼範圍，令復發後的再分期更準確。

檢查前準備

- 如需用靜脈注射造影：
 - 病人需簽署同意書。
 - 檢查前 3 小時請勿進食，可飲用清水。
 - 如曾經對造影劑有過敏反應的病歷，請事先通知醫生。如有需要，醫生會在檢查前處方類固醇藥療。
 - 如糖尿病人正在接受 甲福明 (Metformin) 治療，請於檢查當日及之後 48 小時停止服用有關藥物。
- 檢查前 10 日內不可接受任何鋇類 (Barium) 之 X 光檢查。
- 不合作病人，如需接受鎮靜劑，應由主診醫生決定及處方。
- 造口病者或小便失禁病人請帶備足夠造口或失禁用品。
- 請攜同病歷及相關之檢查報告到本中心，以供參考。

檢查過程

- 檢查所需時間約需 2 至 3 小時，整個過程在醫護人員的監察下進行。
- 放置靜脈注射的導管。
- 注射放射性藥物，需要吸收 1 小時。
- 掃描前清空膀胱。
- 病人躺在掃描機檢查床，然後被送進掃描機的環形通道內。掃描需時 20 分鐘，應盡量保持靜止，並依從放射科職員的指導。
- 如有需要，醫生會注射靜脈造影劑增強診斷的準確度。

檢查完成後當天

- 可如常進食及運動。
- 鼓勵多喝水。
- 請坐着小便，避免溢出地板，如廁後請沖水 2 次。
- 避免與孕婦和 12 歲以下的兒童長期密切接觸。



醫療程序須知
前列腺正電子及電腦雙融掃描

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

*Please fill in /
affix patient's label*

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

造影劑併發症

1. **輕微副作用:** 例如痕癢、蕁麻疹、作嘔、嘔吐、熱暖感覺、臂痛、打噴嚏、咳嗽等。
2. **較嚴重的副作用:** 例如氣喘、心律不調、胸口痛、抽搐、腎衰竭、低血壓、昏迷等；這些副作用通常都需要醫生診治而機會率約為一萬分之四。
3. **死亡:** 這種情況很罕有，機會率約為百萬分之二點一。
4. **延遲性的副作用:** 很少病人會出現延遲性的副作用，症狀包括臂痛、痕癢、皮疹、唾液腺疼痛或腫脹等。
5. **造影劑外滲:** 注射造影劑時有可能意外地由針口滲漏到手臂的軟組織，會引致局部腫痛；一般腫痛數日內會消失。嚴重的外滲情況有可能導致皮膚組織壞死。
6. 假如糖尿病人正在接受 **甲福明 (Metformin)** 治療及其腎功能下降，接受注射造影劑會增加乳酸中毒的機會。

備註

如病人對本檢查有任何疑問或有不清楚之處，請向本部門職員查詢。

參考資料

1. 智友站 (網址: www.21.ha.org.hk)
2. ⁶⁸Ga-PSMA PET/CT: Joint EANM and SNMMI procedure guideline for prostate cancer imaging: (Version 1.0, 2017)
3. ACR Manual on Contrast Media (Version 10.3, 2018)

本人已清楚有關程序, 亦有機會對病情及診斷方案提出疑問, 並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係 (如適用)

日期