



醫療程序須知- 前列腺穿刺活組織檢查

Visit No.: Dept.:
Name: Sex/Age:
Doc. No.: Adm. Date:
Attn. Dr.:
Patient No.: PN

Page No:

01	02	03	04	05	06	07	08	09
+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80	+90

Please fill in /
affix patient's label

簡介

當醫生懷疑你患上前列腺癌，便會建議你進行前列腺穿刺活組織檢查。前列腺穿刺活組織是一個侵入性之檢查以診斷前列腺癌，但陰性結果卻不能完全排除癌症發生的可能性。經醫生建議，前列腺穿刺活組織檢查可透過超聲波導引或超聲波結合磁力共振影像下經直腸或會陰進行。

適應症

診斷前列腺病變

檢查過程

1. 前列腺穿刺活組織一般需時 30 分鐘，如以超聲波結合磁力共振影像進行，則需時約 1 小時。
2. 醫生會將超聲波探頭放入直腸內，利用超聲波或結合磁力共振影像導引下，將穿刺針經直腸或會陰插至前列腺抽取組織樣本。
3. 醫生一般會抽取多個活組織作病理化驗。

檢查風險或併發症

手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。

- 敗血症引致生命危險 (<1%)
- 直腸出血
- 精液帶血 (可持續 6 星期)
- 尿路感染 (1-5%)
- 小便帶血 (可持續 1 至 2 星期)
- 小便困難 / 尿瀦留

檢查前準備

1. 醫生會向病者解釋手術過程及可能發生的併發症及簽手術同意書。
2. 若你服用抗血小板或抗凝血功能的藥物，例如亞士匹寧或華富林等，請於進行檢查前告訴醫生，這些藥物在檢查前應停止服用。
3. 檢查前如果有尿道感染的症狀，例如發熱或小便赤痛，宜將有關病徵告訴醫生。
4. 檢查前 6-8 小時禁食禁水。
5. 醫生會處方口服通便藥物或經肛門灌腸劑以清潔腸道。
6. 檢查前更換手術袍、戴帽，除去自己衣物包括內衣褲、假牙、首飾或隱形眼鏡等及請先排空膀胱。

檢查後注意事項

1. 尿液、大便或精液帶血，一般數天後有會消退。
2. 檢查後的數天多喝開水每日約 2 公升。
3. 如尿液或肛門出現大量出血、劇烈痛楚、發冷或發熱(如體溫 38°C 或 100°F 以上)，請即與你的醫生聯絡。
4. 請遵照醫生的指示，按時覆診。

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局「智友站」

醫生已向本人解釋清楚有關手術 / 程序，本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充份解答。

病人 / 病人家屬姓名

簽署

家屬關係(如適用)

日期