

忘記服藥該怎麼辦？

必須遵從醫生指示服藥，因漏服會使治療效果降低。如您忘記服藥，應立刻補服所忘記的劑量，然後按時服用下一個劑量。若記起的時間已十分接近下劑藥的時間，便毋須補服，應按時服用下一個劑量。切勿服用雙倍劑量。



藥物貯存

按包裝或標籤上註明的貯存方法和有效期貯存藥物。一般情況下，藥物應存放在陰涼乾爽及兒童接觸不到的地方。部分抗生素須按指示存放於雪櫃。

注意事項

除經醫生診斷並處方外，切勿自行服食抗生素。因為不但不能改善病情，還可能會導致抗藥性。



此藥物指引只供參考之用
用藥應按照醫生指示
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢
切勿與他人共用藥物

如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725
網址 Website: www.stpaul.org.hk



Ref. No: PHAR-07

Ver.5 Updated: 03/2025



聖保祿醫院
St. Paul's Hospital

抗生素

藥劑部
Pharmacy



抗生素是甚麼？

抗生素是一種可以殺滅或抑制細菌生長的藥物，能用作預防或治療因細菌感染而引致的疾病，但不能醫治傷風或感冒等因病毒引起的疾病。

我須要服抗生素嗎？

部份疾病無須使用抗生素，患者亦能自行痊癒。只有在醫生懷疑或確定細菌感染的情況下才須要使用抗生素。



應如何服用抗生素？

病人須按醫生指示服用抗生素，不可自行加減劑量或次數。即使病情好轉，亦必須服完整個療程，以免出現抗藥性細菌，令抗生素失去藥效。如您有藥物過敏，請告知醫生。如您同時有服用其他藥物或補充劑，亦請告知醫生。因為它們可與抗生素產生相互作用。



「整個療程」是甚麼？

抗生素的「整個療程」是指完全根治感染的時間。療程長短取決於嚴重程度及感染的種類，因此必須按醫生指示完成整個療程。

抗生素的副作用

副作用是藥物產生的不良作用。抗生素最常見的副作用有作嘔、嘔吐及腹瀉，這是因為抗生素會殺死腸道菌群，但並非所有人都會出現副作用。

過敏

有些人會對抗生素過敏，例如盤尼西林 (Penicillins) 或頭孢菌素 (Cephalosporins)。大部份過敏反應皆為輕微及局部性的，例如出疹或痕癢。更嚴重的過敏可以是「過敏性休克」 (Anaphylaxis)，一般會在服藥後數分鐘內出現。其徵狀包括舌頭和臉部腫脹、呼吸急促、大面積的皮疹和失去知覺等。「過敏性休克」是可致命的，因此必須立即求醫。