



注意事項

1. 切勿使用已變色、變壞或過期的藥水。
2. 滴耳藥水一般只須放在室內陰涼乾燥處、避光貯存即可。除非有特別指示，否則不用冷藏。
3. 療程完成後，須棄掉剩餘藥物。
4. 若耳道於用藥後感到痕癢或灼熱，請停止使用並告知醫生。

此藥物指引只供參考之用
用藥應按照醫生指示
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢
切勿與他人共用藥物

如有任何查詢，歡迎聯絡我們 For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部
Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院

Address: St. Paul's Hospital, No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong

電話 Tel: 2830 3725

網址 Website: www.stpaul.org.hk

Ref. No: PHAR-14

Ver.5 Updated: 03/2025



聖保祿醫院
St. Paul's Hospital

滴耳藥水的使用方法

藥劑部
Pharmacy



齊服務 展關懷 WE SERVE & WE CARE

滴耳藥水的使用方法



- 1 徹底清潔雙手。
- 2 用棉花清潔外耳。

- 3 把藥瓶/一次性獨立包裝的滴耳藥水握在手中數分鐘，特別是須要冷藏的藥水，使藥水溫度接近體溫，以免造成不適。



- 4 將頭部傾側或身體側臥，耳朵向上。

- 5 由於外耳道構造彎曲，為拉直耳道，成人須將耳朵往後上方拉，兒童則是往後下方拉。



- 6 依照醫生所指定的滴數，將藥水滴入耳內。避免將滴管接觸到皮膚，以保持滴管清潔。

- 7 滴藥後，輕輕向上及向後拉動耳珠，可助藥水流入耳內。保持頭部傾側約 3-5 分鐘，使藥水充分地被吸收。



- 8 多餘或溢出的藥水可用紙巾拭去。

- 9 將藥水瓶蓋好。一次性獨立包裝的滴耳藥水，則於使用後隨即棄置。

