



注意事項

1. 切勿使用已變色、變壞或過期的灌腸劑。
2. 切勿過度用力地將灌腸劑的瓶嘴放入肛門，以免弄傷。
3. 灌腸劑一般只須放在室內陰涼乾燥處、避光貯存即可。除非有特別指示，否則不用冷藏。
4. 如用藥後感到不適、灼熱或出現副作用，請立即告知醫生。

此藥物指引只供參考之用
用藥應按照醫生指示
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢
切勿與他人共用藥物

如有任何查詢，歡迎聯絡我們 For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院

Address: St. Paul's Hospital, No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong

電話 Tel: 2830 3725

網址 Website: www.stpaul.org.hk



聖保祿醫院
St. Paul's Hospital

灌腸劑的使用方法

藥劑部
Pharmacy



灌腸劑的使用方法



1 徹底清潔雙手。

2 戴上即棄手套。



3 在使用灌腸劑之前，把灌腸劑放在溫水中約 10 分鐘，使藥液接近體溫。



4 打開灌腸劑的保護蓋。可於瓶嘴上塗上水性潤滑劑。

5 側臥，下腿伸直，上腿向前並朝腹部屈曲。兒童可俯伏在成人的大腿上。



6 放鬆肛門，輕輕地將灌腸劑的瓶嘴放入肛門。

7 擠壓瓶身直至藥液完全進入腸內。

8 將雙腿合攏，並維持側臥約 5-10 分鐘，以防止藥液被排出。



9 將藥液排出體外。

10 棄掉即棄手套，並徹底清潔雙手。

