



## 注意事項

1. 芬太尼藥貼只供外用。
2. 如您曾經對任何藥物過敏，用藥前請先徵詢醫生或藥劑師的意見。
3. 請勿用已剪裁或破損的藥貼。
4. 長期使用芬太尼藥貼可能會導致上癮。須依照醫生指示使用藥物，切勿擅自增減劑量。
5. 請記錄貼上藥貼之時間和日期，並按時更換藥貼。
6. 請勿擅自停藥。如突然停止用藥，可能會出現脫癮徵狀。
7. 切勿與他人共用藥物。
8. 懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳的婦女在用藥前請先告知醫生和藥劑師。
9. 若須要進行手術，請先告知醫生和牙醫您正在使用芬太尼藥貼。
10. 芬太尼藥貼中或含有金屬，在磁力共振掃描前須預先移除藥貼。
11. 用藥期間，切勿飲酒，駕駛或操作機械。
12. 使用藥貼期間可如常浸浴、淋浴和游泳。洗澡時，應避免使用沐浴油和用熱水直接沖洗或浸泡藥貼。請勿在藥貼或附近地方使用肥皂。洗澡後，應輕輕拍乾身體。

13. 應避免使用會發熱的用品，例如暖水袋、電熱毯等，亦應避免浸熱水浴或曬太陽，因熱力可使藥貼加快釋放，而導致藥物過量吸收。
14. 在用藥期間，如有發燒，呼吸困難，頭暈或精神混亂等徵狀，須立刻求醫。
15. 用藥後如果病徵沒有得到改善或甚至惡化，應立刻求醫。

## 藥物貯存

1. 藥貼應存放在兒童不能觸及的地方。
2. 藥貼應存放在陰涼、乾爽的地方及避免陽光直接照射。
3. 藥貼在未使用前，切勿開封。

此藥物指引只供參考之用  
用藥應按照醫生指示  
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢  
切勿與他人共用藥物

如有任何查詢，歡迎聯絡我們  
For enquiry, please feel free to contact us

### 藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院  
Address: St. Paul's Hospital  
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong  
電話 Tel: 2830 3725  
網址 Website: [www.stpaul.org.hk](http://www.stpaul.org.hk)

Ref. No: PHAR-17 Ver.3 Updated: 03/2025



# 芬太尼藥貼的使用方法

藥劑部  
Pharmacy



## 芬太尼藥貼是什麼？

芬太尼藥貼是含嗎啡類藥物的強力鎮痛藥貼，透過藥貼持續釋放，藥物可透過皮膚吸收到血液中，從而提供長達 72 小時(3 天)的持續鎮痛效果。

## 用途


芬太尼藥貼適用於舒緩中度至嚴重程度的慢性疼痛。

## 如何發揮作用？

藥貼中的芬太尼經由皮膚吸收後，會於中樞神經系統發揮藥效，從而達至止痛效果。因此藥貼不必直接貼於疼痛的位置上。

## 使用方法

1. 可選擇貼於胸前、背部或上臂一處平坦、無傷口、且沒有毛髮的皮膚上。請勿貼於皮膚有破損，多毛髮或最近曾接受電療的部位。當用於兒童或有認知障礙的病人身上時，建議把藥貼貼於上背部，以防止藥貼被病人移除。如有需要，可用剪刀將毛髮修剪至貼近皮膚，但切勿使用剃刀刮除毛髮，以免刺激皮膚。
2. 使用藥貼前，應先清洗雙手及皮膚，然後輕輕拍乾。切勿於皮膚上使用肥皂、乳液、潤膚油或酒精。
3. 從包裝袋取出藥貼。切勿剪裁芬太尼藥貼。如包裝袋已被開封，或藥貼有破損，請勿使用。



4. 小心地移除藥貼背面一邊的膠膜。請勿觸摸黏貼面。



5. 先將藥貼的黏貼面貼在皮膚上。然後移除另一邊的膠膜，並把餘下的部份貼於皮膚上。然後用手掌按壓 30 秒，以確保藥貼完全緊貼皮膚。
6. 貼上藥貼後，應立即洗手。
7. 將藥貼連續貼於皮膚上 72 小時。72 小時後，應把藥貼從皮膚上除下。
8. 並參照「[藥貼的棄置方法](#)」，按指示棄置已使用的藥貼。
9. 除下舊藥貼後，於另一處合適的皮膚貼上新藥貼。每次更換藥貼的時間應該相同。同一位置須等待 5 至 7 天後，方可再次貼上藥貼。

## 常見的副作用

常見的副作用包括便秘、昏昏欲睡、噁心或嘔吐、疲倦、頭暈、頭痛、腹痛等。

如出現過敏反應，例如皮膚痕癢、面部或手部腫脹、呼吸困難等等，請立即求醫。

## 忘記用藥的處理方法

應於記起時盡快更換藥貼並記錄日期及時間。之後照常於 72 小時後更換藥貼。

若非按照醫生指示，切勿同時使用超過一片藥貼。

## 藥貼於 72 小時內掉落

應按指示棄置掉落的藥貼，並於另一合適處貼上一片藥貼及通知醫生。

## 藥貼的棄置方法

- 1(A). 棄置已使用的藥貼: 須將其黏貼面對摺，然後棄置。
- 1(B). 棄置已過期及未經使用的藥貼: 須先將藥貼背面的膠膜去掉，並將其黏貼面對摺，然後棄置。
2. 將已對摺的藥貼棄置於兒童不能觸及和視線範圍外的地方。已使用的藥貼可能仍含有少量餘藥，對兒童而言亦可能足以致命。
3. 棄置藥貼後須徹底洗手。