



檢查劑量計數器

劑量計數器上顯示的數字會隨著已使用的劑量而改變。所顯示的數字代表您已使用的次數。此噴鼻劑保證可使用最少 14 劑量。



當計數器上的數字顯示為 16 時，代表此噴鼻劑已用完。瓶中殘留少量藥水乃屬正常現象。

注意事項

- 切勿搖晃噴鼻劑，否則會產生氣泡而影響劑量。
- 如果使用噴鼻劑後感到鼻孔不適，請通知醫生。

藥物貯存

- 未開封的密鈣息®噴鼻劑應存放在 2~8°C 的雪櫃內。
- 開封後，噴鼻劑可存放在 25°C 以下的室溫環境中四星期。
- 密鈣息®噴鼻劑應直立放置。



開封前

開封後

此藥物指引只供參考之用
用藥應按照醫生指示
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢
切勿與他人共用藥物

如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部
Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725
網址 Website: www.stpaul.org.hk



Ref. No: PHAR-01


Ver.5 Updated: 03/2025

「密鈣息®」噴鼻劑 的使用方法


藥劑部
Pharmacy




初次使用前的準備




打開保護蓋，以直立的方式握住瓶身，並按壓噴鼻劑三次。



第一次按壓時，劑量計量器會顯示紅白色線條。



第二次按壓時，會顯示出白色。



第三次按壓時，會顯示出綠色。
此時，您已可以開始使用該噴鼻劑。

「密鈣息®」的使用方法

- 1 在使用全新的密鈣息®噴鼻劑前，應先將噴鼻劑從雪櫃中取出，置於室溫中回溫。



- 2 清理鼻腔內的分泌物。

- 3 徹底清潔雙手。




- 4 打開保護蓋，並以單手拿起噴鼻劑。切勿搖晃噴鼻劑。

- 5 使用時，頭微微向前傾。把噴鼻劑噴咀放入其中一邊鼻孔內，並用手指按著另一邊鼻孔以將其緊閉。將噴咀指向鼻孔外側並遠離鼻中隔。



- 6 按壓噴鼻劑一下以噴出一劑噴霧於鼻孔中。



- 7 移開噴鼻劑，然後經鼻孔吸氣，這有助藥水留於鼻腔內。

- 8 應輪流於兩邊鼻孔使用噴鼻劑，以減低鼻子不適，及幫助藥物吸收。



- 9 使用完畢後，應立即用紙巾清潔噴咀，並且蓋回保護蓋。