




注意事項

1. 肛門塞藥應在使用前才除去原有包裝，以免藥物因變質而失效。
2. 如用藥後感到不適、灼熱或出現副作用，請立即告知醫生。



藥物貯存

肛門塞藥一般只須放在室內陰涼乾燥處、避光貯存即可。除非有特別指示，否則不用冷藏。

肛門塞藥應存放在兒童不能觸及的地方。

此藥物指引只供參考之用
用藥應按照醫生指示
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢
切勿與他人共用藥物

如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725
網址 Website: www.stpaul.org.hk

Ref. No: PHAR-04


Ver.5 Updated: 03/2025



聖保祿醫院
St. Paul's Hospital

肛門塞藥的使用方法

藥劑部
Pharmacy



肛門塞藥的使用方法



- 2 如塞藥太軟，可先浸在凍水或放入雪櫃(切勿放入冰格)以令塞藥變硬，以便使用。



- 5 如有需要可用水性的潤滑劑潤滑塞藥的頂部(尖圓的部份)，或用水濕潤肛門以代替潤滑劑。



- 7 側臥，下腿伸直，上腿向前並朝腹部屈曲。兒童可俯伏在成人的大腿上。



- 8 放鬆肛門，插入塞藥，並用手指推進。兒童約二厘米深，成人約三厘米深。

- 9 將雙腿合攏，保持臀部肌肉收緊數秒，其後維持側臥約十五分鐘。



- 10 塞藥有機會融化及流出，如出現此情況，可用紙巾清潔乾淨。最後扔掉手指套或手套。用肥皂及清水徹底洗淨雙手。