

4. 用藥後應保持躺姿數分鐘，不要站起或走動，因此最好在睡前進用藥。
5. 用肥皂及清水徹底洗淨雙手及投藥器。



注意事項

1. 塞劑於體溫下會融化並發揮藥效。因此，若貯存的溫度高於體溫時，塞劑可能會軟化或融化。如出現此情況，可先將塞劑浸於冷水中令其變硬，以便使用。
2. 塞劑於使用前應維持原包裝，不應自行拆裝，以免藥物失效變質。
3. 使用後如有黏稠或水狀液體自陰道流出，乃屬正常現象。患者可在內褲墊衛生棉墊，請勿在用藥後立即沖洗陰道。
4. 於睡前用藥可延長藥物停留在陰道的時間，從而提高療效。

5. 即使症狀消失，仍須繼續使用陰道塞劑，直至整個療程完畢。月經期間仍要繼續用藥，不應擅自停藥。
6. 孕婦不應使用陰道投藥器，以免刺激陰道，造成子宮收縮而流產。
7. 用藥期間應避免發生性行為，或請男性使用安全套，以免交叉感染。
8. 如用藥後感到不適、灼熱或出現副作用，請告知醫生。

此藥物指引只供參考之用
用藥應按照醫生指示
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢
切勿與他人共用藥物

如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725
網址 Website: www.stpaul.org.hk




Ref. No: PHAR-08 Ver.5 Updated: 03/2025

陰道塞劑的使用方法

藥劑部
Pharmacy



使用陰道塞劑的方法





- 1 徹底清潔雙手。
如有需要，可戴上
手指套或即棄手套。

- 2 打開包裝，在塞劑頭部塗上水性潤滑劑或沾點溫水潤滑，以便推入陰道。



3.1 徒手給藥法

仰臥床上，兩腿曲起向外張開，用手指把塞劑推入陰道口。放妥後，輕輕將塞劑用手指推3-5厘米，以免塞劑滑出。



3.2 投藥器給藥法

拉開投藥器的活塞，將塞劑較鈍的一端放入投藥器的杯形尾端。曲腿將投藥器插入陰道。然後輕輕的壓下活塞，把塞劑推入陰道內，然後可將投藥器從陰道取出。

