




注意

1. 藥品使用前應維持藥廠原包裝，不應自行拆裝，以免藥物失效變質。
2. 若病情持續或惡化，或感到以前沒有試過的肛門不適（如燒灼或刺激感），要儘快通知醫生。



儲存方式

應儲存在陰涼及乾爽的地方，避免陽光照射。除有特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內。此外，藥物須妥善儲存，以免兒童誤服發生意外。



此藥物指引只供參考之用。
用藥應按照醫生指示。
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢。
切勿將自己的藥物給予他人使用。

如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725

網址 Website: www.stpaul.org.hk


Ref. No.: PHAR-04 Ver.4 Updated: 04/2022



聖保祿醫院
St. Paul's Hospital

使用「肛門塞藥」 的方法

藥劑部
Pharmacy



使用「肛門塞藥」的方法



- 1 用肥皂及清水徹底清潔雙手。

- 2 如塞藥太軟，可先浸在凍水或放入雪櫃 (切勿放入冰格) 一會兒，以便有適當硬度，較易使用。



- 3 戴上手指套或用完即棄的膠手套。



- 4 除去包裝紙。

- 5 如有需要可用凡士林 (Vaseline) 潤滑塞藥的頭部 (尖圓的部份)，或用水濕潤肛門以代替潤滑劑。



- 6 塞入時以尖圓的部份塞入肛門。若只需使用部份塞藥，可用乾淨的剪刀把塞藥剪開，同樣從尖圓的部份塞入肛門，把剩餘部分丟棄。

- 7 側臥，下腳伸直，上腳向前屈曲。兒童可伏在成人大腿上。



- 8 放鬆肛門，插入塞藥，並用手指推進，塞入肛門。兒童約二厘米深，成人約三厘米深。

- 9 將雙腿合攏，維持側臥姿勢約十五分鐘，以防塞藥倒擠出來。



- 10 塞藥有機會融化及流出，如出現此情況，可用紙巾清潔乾淨。最後扔掉手指套或手套。用肥皂及清水徹底洗淨雙手。