

如忘記服藥該怎麼辦？

如真的忘記了，應立即補服所忘記服食的劑量，然後依照下一次的指定時間服藥。但如果當時已過了服藥時間的一半，便毋須補服，應依時服食下一個劑量。切勿服用雙倍藥量。



應如何儲存抗生素？

藥物的包裝上通常會註明藥物的儲存方法及有效日期。一般情況下，為免藥物變質，藥物應儲存於陰涼的地方及兒童接觸不到的地方，部分藥物須按指示放進雪櫃。



注意

病徵相似並不代表是同一疾病，而且每個人的體質亦不一樣，因此胡亂使用別人的藥物或上次剩下的藥物是十分危險的。

此藥物指引只供參考之用。
用藥應按照醫生指示。
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢。
切勿將自己的藥物給予他人使用。


如有任何查詢，歡迎聯絡我們
For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院
Address: St. Paul's Hospital
No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話 Tel: 2830 3725

網址 Website: www.stpaul.org.hk

Ref. No.: PHAR-07 Ver.4 Updated: 04/2022



甚麼是抗生素？

抗生素是一種可以殺滅或抑制細菌生長的藥物，只能用作預防或治療因細菌感染而引致的疾病，但不能醫治病毒引起的疾病，例如傷風或感冒。

抗生素的種類很多，功效則視乎細菌的特性而有所不同，故不可胡亂服用。不正確使用抗生素不但無法治療疾病，亦會使細菌產生抗藥性，失去治療的功效。因此，抗生素需要醫生處方。

我需要吃抗生素嗎？

針對不同的疾病，有不同的治療方法。而只有細菌感染才需要使用抗生素治療，有些疾病甚至不需要使用藥物也會自己痊癒，病人應向醫生詢問自己的疾病是否細菌感染，以及是否需要服用抗生素。



應如何服用抗生素？

不應自己亂服抗生素，應先看醫生，由醫生處方後，再根據指示服藥。要定時定量服用，不可隨便加減藥量及次數。即使病情已經好轉，亦必須要服完整個療程，否則不能根治疾病，病菌亦會產生抗藥性。

若曾經對抗生素有過敏反應，必須在診症時告訴醫生。未經醫生指示，不要在同一時間服食多種不同藥物，包括中藥和口服避孕藥，以免引致藥物互相干擾。



甚麼是整個療程？

抗生素的整個療程是指需要把所有病菌殺死的時間。不同的疾病和不同的抗生素所需的療程亦不一樣。因此必須按指示完成整個療程。

抗生素的副作用

副作用是藥物造成的不良作用。抗生素最常見的副作用是腹瀉、作嘔及嘔吐，因抗生素會將腸道的益菌殺死，但並非所有服用者都會出現副作用。

過敏

有些人會對抗生素過敏，特別是對盤尼西林 (Penicillins) 或頭孢菌素 (Cephalosporins) 是其中例子。對抗生素過敏的反應包括出疹痕癢或輕微氣喘。嚴重過敏反應或過敏性休克的徵狀包括面部、頸喉及舌頭腫大，呼吸困難，血壓下降，失去知覺等。過敏性休克是足以致命的嚴重急性病況，若服用抗生素或任何其他藥物後出現上述徵狀，應立即停藥，並到附近醫院求醫。

