

滴耳藥水使用方法

藥劑部
Pharmacy



注意

1. 切勿使用已變色、變壞或過期的藥水。
2. 滴耳藥水一般只須放在室內陰涼乾燥處，避光儲存即可。除非有特別指示，否則不用冷藏。
3. 開瓶後，請根據個別藥物的建議時間棄掉。
4. 用藥後若耳道痕癢或有燒灼感，應告知醫生。

此藥物指引只供參考之用。
用藥應按照醫生指示。
如有疑問請向主診醫生或藥劑師查詢。
切勿將自己的藥物給予他人使用。

如有任何查詢，歡迎聯絡我們 For enquiry, please feel free to contact us

藥劑部 Pharmacy

地址: 香港銅鑼灣東院道2號 聖保祿醫院

Address: St. Paul's Hospital, No. 2, Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong

電話 Tel: 2830 3725

網址 Website: www.stpaul.org.hk

Ref. No.: PHAR-14 Ver.4 Updated: 04/2022



使用方法



- 1 清潔雙手。
- 2 用藥棉清潔外耳。

- 3 把藥瓶握在手中數分鐘，使藥水溫度接近體溫，尤其如需要冷藏的藥水，滴藥時會較舒服。




- 4 將頭部傾側或身體側臥，耳朵向上。

- 5 由於外耳道構造彎曲，為方便滴劑流入，成人須將耳朵往後上方拉，小孩則是往後下方拉。



- 6 依照醫生所指定的滴數，將藥水滴入耳內。避免將滴管接觸到耳朵，以免污染滴管。

- 7 滴藥後，手持耳珠向上及向後輕搖，可助藥水流入耳內。保持頭部傾側約兩分鐘，使藥水充分在耳內發揮作用。



- 8 如有藥水流出，用紙巾抹乾外耳。

- 9 將滴管放回藥水瓶內蓋好。

- 10 如需要，請讓其他人為你滴耳藥水。

